

 Logo Azienda	Cognome	Barcode
	Nome	
	Data di nascita	
	N° CCI/Nosologico	

CLASSIFICAZIONE NPUAP-EPUAP dell'ulcera da pressione

CATEGORIA	DESCRIZIONE
CATEGORIA I . ERITEMA NON SBIANCANTE	<p>Cute intatta con eritema non sbiancante di un'area localizzata generalmente in corrispondenza di una preminenza ossea. Nella cute di pelle scura lo sbiancamento potrebbe non essere osservabile; il suo colore può differire dall'area circostante. L'area può essere dolente, dura, molle, più calda o più fredda in confronto al tessuto adiacente. E' possibile che nelle persone di pelle scura la Categoria I sia difficile da individuare. Può segnalare una persona a rischio.</p>
CATEGORIA II . SPESSORE PARZIALE	<p>Perdita di spessore parziale del derma che si presenta come un'ulcera aperta superficiale con un letto di ferita rosa, senza slough. Può anche presentarsi come una vescicola intatta o aperta/rotta ripiena di siero o di siero e sangue. Si presenta come un'ulcera lucida o asciutta, priva di slough o ematoma (l'ematoma indica un danno tissutale profondo). Questa Categoria non dovrebbe essere usata per descrivere skin tears (lacerazione cutanee da strappamento), ustioni da cerotto, dermatiti causate dall'incontinenza, macerazione o escoriazione.</p>
CATEGORIA III . PERDITA DI CUTE A TUTTO SPESSORE	<p>Il tessuto adiposo sottocutaneo può essere visibile, ma l'osso, il tendine o il muscolo NON sono esposti. Può essere presente slough ma senza nascondere la profondità della perdita tissutale. Può includere tratti sottominati e tunnellizzazione. La profondità di un'ulcera da pressione di Categoria/Stadio III varia a seconda della posizione anatomica. Le narici del naso, l'orecchio, l'occipite e il malleolo non sono dotati di tessuto sottocutaneo (adipe) e le ulcere di Categoria/Stadio III possono essere superficiali. Al contrario, aree con significativa adiposità possono sviluppare ulcere da pressione di Categoria/Stadio III molto profonde. Osso/tendine non sono visibili o direttamente palpabili.</p>
CATEGORIA IV . PERDITA TESSUTALE A TUTTO SPESSORE	<p>Perdita tissutale a tutto spessore con esposizione di osso, tendine o muscolo. Potrebbero essere presenti slough o escara. Spesso include sottominatura e tunnellizzazione. La profondità di un'ulcera da pressione di Categoria/Stadio IV varia a seconda della regione anatomica. Le narici del naso, l'orecchio, l'occipite e il malleolo non hanno tessuto adiposo sottocutaneo e queste ulcere possono essere superficiali. Le ulcere da pressione di Categoria/Stadio IV possono estendersi a muscoli e/o strutture di supporto (es. fascia, tendine o capsula articolare) rendendo probabile l'osteomielite o l'osteite. L'osso/tendine sono esposti, visibili o direttamente palpabili.</p>