


 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</p> <p>Logo Azienda</p>	Cognome	Barcode
	Nome	
	Data di nascita	
	N° CCI/Nosologico	

**SCORE DI BISHOP**

Cm	0	1-2	3-4	≥ 5	Cefalica <input type="checkbox"/>
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
% <b>Appianamento</b>	0-30	40-50	50-60	≥ 80	<b>Presentazione</b> Non valutabile <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Impegno</b>	-3	-2	-1:0	1:2	<b>Situazione</b> Traversa <input type="checkbox"/> Obliqua <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Consistenza</b>	dura	media	soffice		<b>Manovre di Leopold</b> Eseguite <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Posizione</b>	post.	med.	ant.		<b>Note</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Membrane</b>	Integre <input type="checkbox"/>	<b>Perdita ematica</b>	Assente <input type="checkbox"/>		
	Rotte <input type="checkbox"/>		Scarsa <input type="checkbox"/>		
	Amniorexi* <input type="checkbox"/>		Abbondante <input type="checkbox"/>		
* specificare giorno e ora: .....					
<b>Liquido amniotico</b>	Limpido <input type="checkbox"/>	<b>BCF</b>	Assente <input type="checkbox"/>	<b>Bishop score</b>	
	Presenza non significativa di meconio <input type="checkbox"/>		Percepito <input type="checkbox"/>		
	Presenza significativa di meconio <input type="checkbox"/>		Monitorizzato <input type="checkbox"/>		
			<b>NST-CTG</b>	Normale <input type="checkbox"/>	
				Eseguito <input type="checkbox"/>	Indeterminato <input type="checkbox"/>
				Non eseguito <input type="checkbox"/>	Anormale <input type="checkbox"/>
<b>Movimenti fetali</b>		Normali <input type="checkbox"/>	Data / ora: .....		
		Ridotti <input type="checkbox"/>	Data / ora: .....		
		Assenti <input type="checkbox"/>	Data / ora: .....		
P.A...../.....		Frequenza cardiaca materna.....		Peso.....	
Edemi	assenti <input type="checkbox"/>	presenti <input type="checkbox"/>	localizzati <input type="checkbox"/>	generalizzati <input type="checkbox"/>	
Varici	assenti <input type="checkbox"/>	presenti <input type="checkbox"/>	sede .....		
Alvo	regolare <input type="checkbox"/>	stipsi <input type="checkbox"/>	MEOWS score.....		
Albuminuria*	Assente		Tracce	Dosabile	
* Parametro da rilevare al bisogno in seguito a valutazione clinica					
MEOWS Score : punteggio .....					
				<p>Scala NRS (valutazione all'ingresso)</p> <p>_____</p>	

**DIAGNOSI ALL'INGRESSO**

.....  
.....

Data .....

Firma.....

## PUNTEGGIO DI PREALLARME OSTETRICO

Score	3	2	1	0	1	2	3
Temperatura		<35	35-36	36,1-37,7	37,8-38,3	≥ 38,4	
Pressione Sistolica	<70	71-80	81-90	91-130	131-139	149-169	>170
Pressione Diastolica			<45	46-89	90-99	100-109	>110
Frequenza cardiaca		<40	41-59	60-100	101-110	111-129	>130
Frequenza Respiratoria	<7			8-18	19-22	23-29	>30
Livello Coscienza		Agitazione Confusione		Vigile	Risponde agli stimoli vocali	Risponde agli stimoli dolorosi	Privo di coscienza
Perdite vaginali	Presenza significativa di meconio	Presenza <b>non</b> significativa di meconio	L.A. chiaro	Assenti	Ematiche lievi	Ematiche franche	Ematiche abbondanti
Contrazioni uterine	Presenza di premito	Presenti ogni 3 -5`	Presenti ogni 10-15`	Assenti Sporadiche		Utero subcontratto	Iperono uterino
Movimenti fetali	Assenti	Ridotti		Avvertiti regolari			
Frequenza cardiaca fetale	<100		100-109	110-160	161-180		>180

## **Sistema di Preallarme (Meows Score Modificato)**

L'adozione del sistema di preallarme è incluso tra le raccomandazioni redatte per la prevenzione della mortalità materna.

Viene impiegato in tutte le pazienti critiche o in quelle che giungano all'osservazione degli operatori dell'Ambulatorio di Urgenze Ostetrico Ginecologiche /Ambulatorio Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico.

Il sistema classico di preallarme è stato adattato per l'impiego in ostetricia e tiene conto anche delle condizioni correlate all'eventuale insorgenza del travaglio e dello stato del feto.

Lo scopo del Punteggio di Meows (Modificato) è di dare uno strumento allo staff assistenziale per individuare le condizioni morbose che possono evolvere in situazioni acute e/o critiche, al fine di assicurare un pronto ed appropriato intervento, definendo la rivalutazione del caso.

***La probabilità di deterioramento clinico è bassa se il punteggio è inferiore a 2, media se compreso tra 2 e 4 alta se > di 4.***

Nessun metodo di assegnazione di un punteggio potrà mai essere superiore alla valutazione clinica immediata e continua. Il punteggio che si ottiene dal sistema di preallarme comporta i seguenti benefici:

1. Fornisce un sistema standardizzato ed oggettivo che misuri l'evoluzione clinica e il possibile deterioramento.
2. Facilita l'individuazione delle donne esposte al rischio di deterioramento
3. Rafforza e consente alle ostetriche/ infermiere/ medici di condividere l'intervento elenco-assistenza con operatori esperti.

**Valori di punteggio e monitoraggio corrispondente:**

⇒ ***Punteggio < 2 la rivalutazione può essere condotta ogni 2 ore***

⇒ ***Punteggio = 2 la rivalutazione deve essere condotta ogni 30'***

⇒ ***Punteggio > 2 e ≤ 4 deve essere convocato il medico e in attesa del suo arrivo la rivalutazione deve essere condotta ogni 15' ( o più frequentemente qualora se ne valuti la necessità).***

⇒ ***Punteggio > 4 deve essere allertata l'Ostetrica più esperta. In attesa del Medico convocato d'urgenza, la paziente viene mantenuta sotto stretto controllo clinico.***