

## Allegato OAA 3 – ESAMI EMATICI E INDAGINI

## Esami per attività ambulatoriale livello 2

PER TUTTI	PER ANZIANO AGGIUNGERE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emocromo</li> <li>• Glicemia</li> <li>• Emoglobina glicata (HbA1c)</li> <li>• Creatinina</li> <li>• Colesterolo totale</li> <li>• Colesterolo HDL</li> <li>• Trigliceridi</li> <li>• Transaminasi (AST, ALT)</li> <li>• Acido Urico</li> <li>• Elettroliti sierici</li> <li>• TSH</li> <li>• PCR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elettroforesi delle proteine sieriche</li> <li>• Vitamina D</li> <li>• Vitamina B12</li> <li>• Acido folico</li> </ul> <p>Valutare effettuazione di MOC o DEXA per diagnosi di osteo-sarcopenia</p>

## Esami e indagini per la chirurgia bariatrica

ESAMI DI PRIMO LIVELLO	ESAMI DI SECONDO LIVELLO
ESAMI EMATOCHIMICI	
<p>vitamina B12, folati, ferro, ferritina, transferrina, glicemia, Hb glicata, insulina, paratormone, vitamina D 25-OH, colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, GOT, GPT, gamma-GT, bilirubina frazionata, fosfatasi alcalina, calcemia, fosforemia, magnesiemia, uricemia, creatinina, sodio, potassio, proteine totali, albumina, emocromo, TSH reflex, highly sensitive c-reactive protein (HSPCR).</p> <p>Se indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dosaggio C peptide (in paz. diabetici)</li><li>- cortisolo salivare notturno</li></ul>	<p>Se indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- curva da carico di glucosio per glicemia e insulina (casi selezionati: donne con pregresso diabete gestazionale, paz. con severa insulino-resistenza, paz. con alterata glicemia a digiuno)</li></ul>
ESAMI STRUMENTALI	
Esofagogastroduodenoscopia (EDGS)	Rx esofago stomaco duodeno (casi selezionati dopo EGDS)
Ecografia addome completo	
VISITE SPECIALISTICHE	
Visita psicologica / Visita psichiatrica	
Visita cardiologica e Tracciato ECG	Ecocardiogramma (su richiesta del cardiologo)
	<p>Se score &gt; 5 al questionario STOP-bang =&gt; Visita pneumologica</p> <p>Su indicazione dello pneumologo: prove di funzionalità respiratoria ossimetria notturna o polisonnografia (OSAS grave che richiede C-PAP pre-intervento)</p>