lavoro sicuro senza alcol

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Regione Emilia-Romagna

I consumi e le opinioni dei lavoratori

Gianfranco De Girolamo

Base dati

3739 questionari raccolti in 30 stabilimenti nel periodo 2007/2010

327 (8,7%) questionari e **4** items esclusi dall'analisi

3412 questionari analizzati, con un grado medio di risposte valide ai singoli items del 96,4% (82,2-100).

Caratteristiche del campione (%)




RUOLO
dirigente 2
preposto 12
impiegato 26
operaio 59
COMPARTO
Abbigliamento 3
Agricoltura 4
Alimentare 11
Ceramica 9
Chimica 6
Edilizia 12
Elettricità, gas, acqua, rifiuti 21
Legno 0
Metallurgia 8
Metalmeccanica 8
Servizi 18
LAVORO IN QUOTA
No 83
Si 17
LAVORO ALLA GUIDA
No 76
Si 24
INFORTUNI SUL LAVORO
No 93
Si 7
GG. MALATTIA
Nessuno 53
<30 44
30 - 60 2
60+ 1
0
20
40
60
80
100
%

% donne

In totale 27% con notevoli differenze tra alcuni sottogruppi:

la % è più alta tra:

- Laureati (47%)
- Vedovi (61%), Separati/Divorziati (39%)
- Impiegati (37%)
- Addetti in Abbigliamento (45%), Agricoltura (54%), Ceramica (44%) e Servizi (56%)

la % è più bassa (nettamente) tra:

- Dirigenti (19%), Preposti (10%)
- Addetti in Edilizia (9%), Elettricità…(12%), Metallurgia (2%), Metalmeccanica (12%)

Percentuale Donne per Caratteristiche campione



27 : % del totale campione

Età media

42 anni con differenze moderate tra sottogruppi tranne alcuni:

età media più alta tra:

- chi ha Licenza elementare o nessun titolo (48)
- Vedovi (49)
- Dirigenti (48)

Età media più bassa tra:

- Celibi / Nubili (36)
- Addetti in Metallurgia (34)

Età media per caratteristiche campione



42: età media del totale campione

Titolo di studio medio/alto

In totale 63% ha la licenza Media Superiore o la Laurea, differenze per alcuni sottogruppi:

la % è più alta tra:

- Donne (68%) (poco)
- <= 40 anni (72 e 81%)
- Celibi/Nubili (72%)
- chi fa Att.Fisica (70%)
- Dirigenti e Impiegati (95 e 91%)
- Addetti in Chimica e Servizi (76 e 74%)

la % è più bassa tra:

- Vedovi, Separati/Divorziati (45 e 54%)
- chi Non fa Att.Fisica (55%)
- Non soddisfatti dello stato di salute (51%)
- Operai (49%)
- Addetti in Ceramica (40%)
- Guidano automezzi (50%)
- con un infortunio nell'ultimo anno (49%)
- con più di 30 gg di malattia in ultimo anno (49 e 45%)

Titolo studio Media sup./Laurea (%) per Caratteristiche campione



63 : % del totale campione

Titolo studio Media sup./Laurea (%) per Caratteristiche campione



63 : % del totale campione

Alcol – Consumatori



Consumatori Alcol
confronto con Passi

La prevalenza di consumatori è perfettamente in linea con quanto emerge dai dati Passi (sia sul totale popolazione, che nel sottogruppo dei lavoratori), con una lieve differenza nella fascia di età 25-34 anni, e con precedente indagine A&L.

Def. Consumatore in A&L:

persona che negli ultimi 3 mesi ha riferito di aver bevuto alcolici

Def. Consumatore in PASSI:

persona che ha riferito di aver bevuto negli ultimi 30 gg almeno una unità di bevanda alcolica

Consumatori bevande alcoliche

confronto A&L vs Passi Lavoratori



Consumatori bevande alcoliche

confronto A&L vs Passi tot. popolazione



Consumatori alcol

72% in tot con notevoli differenze per alcuni sottogruppi:

La % è più alta tra:

- Uomini (78%)
- I Giovani con <=30anni (83%)
- Laureati (78%, cresce con il titolo di studio)
- Preposti (82%)
- Addetti in Metalmeccanica (85%)
- Chi Lavora in quota (80%)
- chi ha fatto tra 1 e 30 gg di Malattia (77%)

Consumatori alcol

La % è più bassa tra:

- Donne (55%)
- Titolo di studio Elementare/Nessuno (44%)
- Vedovi (56%)
- Addetti in Abbigliamento, Agricoltura, Ceramica e Servizi (61, 64, 63 e 64%)
- chi ha fatto più di 30 gg di Malattia (58 e 60%)

% consumatori alcol e variabili socio-demografiche



% consumatori alcol e lavoro



Consumatori per età e sesso
%



Consumatori per tipo bevande
%



Consumatori per tipo bevande, sesso e classi di età (%)



Consumatore a rischio

persona che risulta essere:

- forte consumatore o
- consumatore fuori pasto o
- consumatore binge


Consumatori a rischio
confronto con PASSI Lavoratori (%)
%
100
80
60
40
20
0
76
47
68
30
42
20
34
20
46
24
<25
25-34
35-49
>49
Totale
A&L
Passi

Consumatori a rischio confronto con Passi

La prevalenza di consumatori a rischio è quasi doppia rispetto a Passi lavoratori: 46 vs 24%.

- Definizioni usate in Alcol&Lavoro più sensibili, spt per consumo fuori pasto e binge
- Campioni non perfettamente comparabili per età e sesso.

- maggiore fiducia in anonimato in A&L ?!
- minor sincerità nel rispondere a intervistatore passi?!

A&L:

Forte consumatore: uomini che bevono 3 o più unità alcoliche al giorno e donne che bevono 2 o più unità alcoliche al giorno (ultimi 3 mesi).

Consumatore **fuori pasto**: persona che ha riferito di bere fuori pasto nell'ultimo anno.

Consumatore **binge**: persona che ha consumato nell'ultimo anno 6 o più bevande alcoliche in un'unica occasione

Passi:

Forte consumatore: uomini che bevono 3 o più unità alcoliche al giorno e donne che bevono 2 o più unità alcoliche al giorno (ultimi 30 gg)

Consumatore **fuori pasto**: persona che ha riferito di bere abitualmente fuori pasto (ultimi 30 gg)

Consumatore **binge**: persona che consuma almeno una volta al mese 6 o più bevande alcoliche in un'unica occasione


Forti Consumatori
confronto con PASSI Lavoratori (%)
%
100
80
60
40
20
0
56
17
47
14
30
11
27
16
33
13
<25
25-34
35-49
>49
Totale
A&L
Passi


Consumatori Binge
confronto con PASSI Lavoratori (%)
%
100
80
60
40
20
0
40
15
24
11
9
9
6
6
12
9
<25
25-34
35-49
>49
Totale
A&L
Passi


Consumatori Fuori pasto
confronto con PASSI Lavoratori (%)
%
100
80
60
40
20
0
68
35
59
15
27
5
15
2
31
8
<25
25-34
35-49
>49
Totale
A&L
Passi

Consumatori a rischio

46% in tot con notevoli differenze per alcuni sottogruppi:

La % è più alta tra:

- I Giovani con <=30anni (74%)
- Laureati (56%, cresce con il titolo di studio)
- Celibi (61%) e Conviventi (59%)
- Fumatori (53%)
- Dirigenti (54%) e Preposti (57%)
- Addetti in Chimica (55%), Legno (64%) e Metalmeccanica (57%)
- Chi Lavora in quota (54%)

La % è più bassa tra:

- Donne (36%) ma differenza minima in <30 anni
- 50+ anni (34%)
- Vedovi (28%) e Separati/Divorziati (38%)

% consumatori a rischio e variabili socio-demografiche



% consumatori a rischio e lavoro



Consumatori a rischio per età e sesso
%



Ha guidato avendo bevuto
almeno 2 ua nelle 2 ore precedenti
(almeno 1 volta in anno)

23% in totale con notevoli differenze per:

Sesso, età, titolo di studio, stato civile, stato di salute, ruolo e comparto. Valori sopra la media anche per chi lavora in quota

Solo il 41% di essi pensa di essersi messo alla guida avendo bevuto troppo

Nel 2002-2004 la % di coloro che si erano messi alla guida avendo bevuto era del 21% e solo il 29% pensava di aver bevuto troppo.

Ha guidato entro 2 ore dal consumo di alcol* - 1



*Almeno 1 volta nell'ultimo anno
almeno 2 UA nelle 2 ore precedenti

Ha guidato entro 2 ore dal consumo di alcol* - 2



*Almeno 1 volta nell'ultimo anno
almeno 2 UA nelle 2 ore precedenti

Guida pensando di aver bevuto troppo (avendo bevuto) - 1



Guida pensando di aver bevuto troppo (avendo bevuto) - 2



Ha lavorato avendo bevuto
nelle 2 ore precedenti (almeno 1 volta in anno)

16% in totale con differenze per

Sesso, stato di salute, ruolo e comparto.
Valori sopra la media per chi lavora in quota

In media consumate 1,6 UA
Il 38% aveva consumato 2+ UA

% minore di coloro che si sono messi alla guida avendo bevuto (23%) – Reale o sottodichiarata?

Ha lavorato entro 2 ore dal consumo di alcol* - 1



*Almeno 1 volta nell'ultimo anno

Ha lavorato entro 2 ore dal consumo di alcol* - 2



*Almeno 1 volta nell'ultimo anno

Lavora pensando di aver bevuto troppo (avendo bevuto) - 1



Lavora pensando di aver bevuto troppo (avendo bevuto) - 2



Secondo lei, l'alcol può provocare danni alla salute?



29% No/Solo in dosi eccessive senza differenze significative nei vari sottogruppi tranne:

tra i giovani (38% in <30anni)

e in chi lavora in altezza (36%).

Nel 2002/2004 tale quota era del 37%.

Quale l’entità del rischio legato all’uso di alcolici in ambito lavorativo ?



15% lieve/moderata/media:

nessuna differenza nei vari sottogruppi

Nel 2002/2004 tale quota era del 13%

percezione del rischio da uso alcol in generale e sul lavoro

(% su campione)



Giudizio su misure di contrasto alla diffusione dei problemi legati al consumo di alcol negli ambienti di lavoro


Vietare il consumo di alcolici nelle mense aziendali/convenzionate
40.3
19.8
40.0
Informare e formare i lavoratori sui rischi e sui comportamenti da adottare per prevenire i danni da alcol
15.0
25.5
59.5
Effettuare controlli (tasso alcolico) ai lavoratori che svolgono attività considerate a rischio
14.7
20.3
65.0
Predisporre uno specifico regolamento aziendale sull'alcol
22.4
26.4
51.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
niente/poco
abbastanza
molto/moltissimo

PERCEZIONE UTILITA' STRUMENTI CONTROLLO E PERCEZIONE RISCHIO



Comportamenti a rischio

correlati con

percezione del rischio

Comportamenti a rischio per livello di percezione del rischio da alcol in generale



Comportamenti a rischio per livello di percezione del rischio da alcol sul posto di lavoro



Propensione a lavorare entro 2 ore dal consumo di alcol e giudizio su strumenti controllo alcol



In sintesi…

Consumo Alcol

72%

Lavoratori • popolazione generale (spt suddividendo per sesso).

Uomini, Giovani e Alto livello di studio

Ruolo (preposti)

Comparto (Metalmeccanica)

Lavoro in quota

Consumo Alcol a Rischio

46%

Alcol&Lavoro>Passi (24%) (Diverse definizioni; sottostima?)

Uomini, Giovani e Alto livello di studio

Ruolo (Dirigenti, preposti, operai)

Comparto (Chimica e Metalmeccanica*, Legno ed Edilizia)

Lavoro in quota e Guida Mezzi

Fumatori e Attivi fisicamente

Alcol & Guida

23% (41% consapevole)

Consapevoli: A&L_2010> A&L_2004 (29%)

Uomini, Giovani e Alto livello di studio

Ruolo (Dirigenti, preposti)

Comparto (Metalmeccanica)

Lavoro in quota e Guida Mezzi

Alcol & Lavoro

16% (8% consapevole)

(sottodichiarazione?)

A&L_2010< A&L_2004 (24%)(frutto attività?)

Uomini

Ruolo (Dirigenti)

Comparto (Edilizia)

Lavoro in quota e Guida Mezzi

Percezione del Rischio da Alcol

ALTA

(71% Salute, 85% Lavoro)

Minoranze meno consapevoli più a rischio

relazione diretta tra bassa percezione del rischio da alcol e predisposizione ad adottare comportamenti a rischio e a ritenere poco utili eventuali misure di contenimento della diffusione dell’alcol sul lavoro.