

Tabella dispositivi medici dispensabili

<b>DTM1 bambini e giovani</b>	<b>Monitoraggio capillare esclusivo</b>	<b>Monitoraggio continuo del glucosio</b>
Strisce reattive per misurazione glucosio	Max 180 (6 misurazioni giornaliere)	Max 50
Lancette pungidito	Max 180 (6 misurazioni giornaliere)	Max 50
Penna pungidito	1 (con riserva 1 di scorta)	1 (con riserva 1 di scorta)
strisce reattive per misurazione chetoni	Max 10-20 (uso occasionale)	
Aghi per somministrazione insulina	(variabile in base alla terapia MDI prescritta dal medico)	

<b>DTM2 bambini e giovani</b>	<b>Monitoraggio esclusivo capillare</b>	<b>Monitoraggio continuo del glucosio</b>
Strisce reattive per misurazione glucosio	stabilire la quantità in base alla frequenza del monitoraggio della glicemia capillare, al trattamento farmacologico e all'utilizzo o meno del CGM.	
Lancette pungidito	stabilire la quantità in base alla frequenza del monitoraggio della glicemia capillare, al trattamento farmacologico e all'utilizzo o meno del CGM.	
Penna pungidito	stabilire la quantità in base alla frequenza del monitoraggio della glicemia capillare, al trattamento farmacologico e all'utilizzo o meno del CGM.	
Aghi per somministrazione insulina	(variabile in base alla terapia MDI prescritta dal medico)	

<b>DTM1 adulto</b>	<b>Monitoraggio esclusivo capillare</b>	<b>Monitoraggio continuo del glucosio</b>
Strisce reattive per misurazione glucosio	120-300 al mese (4-10 misurazioni giornaliere)	Max 50 al mese
Lancette pungidito	120-300 al mese (4-10 misurazioni giornaliere)	Max 50 al mese
Penna pungidito	1 al mese (con riserva 1 di scorta)	
strisce reattive per misurazione chetoni	Max 10-20 al mese (uso occasionale)	
Aghi per somministrazione insulina	(variabile in base alla terapia MDI prescritta dal medico)	

## Tabella dispositivi medici dispensabili

<b>DTM2 adulto</b>	<b>Monitoraggio esclusivo capillare</b>	<b>Monitoraggio continuo del glucosio</b>
<b>Strisce reattive per misurazione glucosio</b>	Basalbolus: Max 180 al mese Basaloral: Max 30 al mese Terapia antidiabetica orale associata a rischio di ipoglicemia: Max 30 al mese	Max 50 al mese
<b>Lancette pungidito</b>	Basalbolus: Max 180 al mese Basaloral: Max 30 al mese Terapia antidiabetica orale associata a rischio di ipoglicemia: Max 30 al mese	Max 50 al mese
<b>Penna pungidito</b>	1 al mese (con riserva 1 di scorta)	
<b>Aghi per somministrazione insulina</b>	(variabile in base alla terapia MDI prescritta dal medico)	

<b>DIABETE GESTAZIONALE</b>	<b>Monitoraggio esclusivo capillare</b>	<b>Monitoraggio continuo del glucosio</b>
<b>Strisce reattive per misurazione glucosio</b>	120 al mese (variabile in base agli obiettivi glicemici raggiunti)	Max 50
<b>Lancette pungidito</b>	120 al mese (variabile in base agli obiettivi glicemici raggiunti)	Max 50
<b>Penna pungidito</b>	1 al mese (con riserva 1 di scorta)	
<b>Aghi per somministrazione insulina</b>	(variabile in base alla terapia MDI prescritta dal medico)	

Dalle quantità definite, calcolare un 5% di materiale in più per coprire eventuali situazioni emergenziali