

Caso n.1 triturazione di compressa e somministrazione attraverso sonda

- **Esigenza:** paziente adulto in nutrizione enterale con sondino nasogastrico
- **Tipologia di alterazione:** triturazione di compresse
- **Farmaco:** calcio antagonista a rilascio prolungato.
- **Contesto:** somministrazione in ritardo rispetto ad orario programmato
- **Evento:** A causa della fretta non viene verificata la “Lista dei farmaci non triturbabili”, l’inf. procede alla triturazione della compressa ed alla contestuale somministrazione tramite sondino naso gastrico. Un'ora dopo , la frequenza cardiaca del paziente rallenta fino ad asistolia



DO NOT
CRUSH !!!!

Caso n.2 paziente con difficoltà di deglutizione

- **Esigenza:** paziente adulto con linfoma primitivo del sistema nervoso centrale in trattamento continuativo con Levitiracetam-Keppra® compresse.
- **Evento:** Dopo trapianto autologo il paziente viene dimesso con terapia domiciliare: Keppra® e Bactrim®. A seguito di sviluppo di mucosite di grado IV, con importante difficoltà di deglutizione, in accordo con il neurologo, viene sospeso il Levitiracetam: in realtà il paziente sospende anche Bactrim. Successivamente il paziente viene ricoverato per una sospetta polmonite da pneumocysti carinii. Viene subito programmata una broncoscopia, ma nel corso della sua esecuzione, il paziente ha una crisi comiziale. Somministrazione di fenobarbitale iv e benzodiazepine iv.
- **Farmaco:** Levetiracetam farmaco a basso IT, non è possibile procedere alla triturazione. Si decide quindi per la somministrazione per via endovenosa.