

HPV疫苗提供更大保护

人类乳头瘤病毒(HPV)疫苗宣传计划

预防感染和癌症
青少年男性与女性





什么是人类乳头瘤病毒(HPV)?

这是一组分布广泛的病毒。

共有超过100种血清型,其中超过40种可能导致男女生殖系统感染。一般而言,HPV感染是暂时性的,并无症状(即感染者不会察觉),大部分情况下会自愈。

某些HPV血清型可能会导致生殖器(子宫颈、外阴、阴道、肛门、阴茎)和口咽黏膜细胞病变,如果经久不愈,可能会发展为癌症。

人类乳头瘤病毒如何传播?

它通过性关系传播,包括不完全的性关系。

它是最普遍的性传播感染。


使用安全套可降低但不能完全阻止病毒传播,因为这种病毒也可能存在于未受安全套保护的皮肤上。

如何治疗人类乳头瘤病毒感染?

不存在对症的治疗。

要及时诊断由HPV引起的子宫颈细胞病变,需要定期根据邀请进行HPV测试或巴氏测试(PAP test)筛查。

对于其他部位(外阴,阴道,阴茎和口咽),目前没有筛查计划。



疫苗安全吗？它是如何构造的？

疫苗是安全的。

疫苗成分不含活体病毒，保证不会导致感染，但可以诱发对抗病毒的免疫反应。

迄今为止所进行的多项研究，以及对所有欧洲和欧洲以外国家的售后监控，均证明疫苗的耐受性良好。

数百万人已接种HPV疫苗，并未发现严重反应。

可能出现的反应包括：注射部位红肿，发烧，恶心，眩晕，头疼和关节疼痛。

一般而言均为轻微短暂的症状。

HPV疫苗可预防感染吗？

疫苗可预防疫苗本身包含的HPV血清型感染，因此可预防可能导致癌症的细胞病变的形成。

疫苗有效吗？

是的。多项研究表明，如在未与病毒发生接触之前（即在发生首次性关系前）接种疫苗，可保证预防癌前病变和癌变及湿疣（生殖器疣）的最佳保护效果。

目前，艾米利亚-罗马涅的大区使用的疫苗可预防9种人类乳头瘤病毒血清型，可预防几乎90%的宫颈癌，约80%的其他HPV相关癌症及几乎100%的湿疣。

疫苗的效力可持续多长时间？

研究表明，抗体可持续存在多年，可能终生有效。事实上，目前在基础疗程之后并不需要注射加强针。

谁应接种疫苗？

接种疫苗的目的在于预防而非治疗感染：最适宜在可能接触病毒（即首次性关系）之前注射。

如果少男少女已与疫苗内包含的病毒血清型发生接触，疫苗成效会降低。

免费疫苗对谁供应？

大区卫生局保证对所有年满11岁未满12岁的青少年男女免费供应疫苗。相关青少年男女将收到户口所在地卫生局寄送到住址的邀请函，邀请其接种疫苗。1996年及其后出生的青少年女性将可保持免费接种疫苗的权利至其年满26岁。2006年及其后出生的青少年男性可保持免费接种疫苗的权利至其年满18岁。

HPV疫苗提供更大保护

人类乳头瘤病毒疫苗宣传计划

接种疫苗的地点和方式是什么？

疫苗接种由卫生局疫苗诊所的医疗工作人员进行。

根据年龄，应在三角肌（上臂）通过肌肉注射，接种两剂或三剂疫苗。

成年人也应接种疫苗吗？

临床研究表明，疫苗对成人也有良好效果，然而其功效低于青少年，因为成人已接触性关系相关HPV病毒的可能性更高。

因此，大区卫生局也为成年人和在2006年前出生的青少年男女提供价格优惠的疫苗，可在大区卫生局的疫苗诊所接种。

用户所承担的费用显著低于私人诊所的收费，仅相当于卫生局的疫苗成本，加上大区标准的疫苗接种费。

孕妇可以应接种疫苗吗？

不，如果在开始疫苗疗程之后发现怀孕，应等待妊娠期结束后再继续接种。

即使已经接种疫苗，也有必要进行子宫颈癌筛查吗？

是的。筛查可发现不包含于疫苗中的其他血清型所导致的细胞病变。



查阅子女 电子卫生档案 中的疫苗证书

Fascicolo Sanitario
●●●●● elettronico

电子卫生档案

了解如何操作, 请查阅:
fascicolo-sanitario.it

请咨询您的儿医或医生

编辑协调和监督:

Angela Lucarelli, Caterina Di Monte

 **Regione Emilia-Romagna**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

salute.regione.emilia-romagna.it

