

5 ХВИЛИН варті ОДНОГО ЖИТТЯ



UA

СКРИНІНГ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ
У РЕГІОНІ ЕМІЛІЯ-РОМАНЬА

ЩО ТАКЕ СКРИНІНГ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ?

Скринінг дозволяє **запобігти розвитку раку шийки матки** шляхом лікування передракових утворень, які можуть перерости в рак, і знизити смертність за рахунок **раннього виявлення** раку шийки матки.

Скринінг призначений для всіх жінок-мешканок Емілії-Романьї, які користуються послугами охорони здоров'я в цьому регіоні – їх запрошують кожні три роки проходити тест Папаніколау з віці від 25 до 29 років (якщо вони не вакциновані проти вірусу папіломи людини), і кожні п'ять років здавати аналіз на вірус папіломи людини з віці від 30 до 64 років. Скринінговий аналіз **простий, безкоштовний і займає лише кілька хвилин**.

ЧОМУ ВАРТО ПРОХОДИТИ СКРИНІНГ?

Щоб подбати про себе і своє здоров'я. В результаті скринінгу **було досягнуто зниження частоти раку шийки матки**. Увесь процес скринінгу **є безкоштовним і організованим**, від власне тестування до будь-якого лікування і подальшого спостереження.

ЗАВДЯКИ СКРИНІНГУ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

**на 40% менше
нових випадків
раку**

**на 50% нижче
смертність**

ЩО ТАКЕ ТЕСТ ПАПАНІКОЛАУ?

Тест Папаніколау передбачає делікатний **відбір клітин** з шийки матки за допомогою маленького шпателя і щітки; потім цей матеріал аналізують під мікроскопом, щоб виявити **будь-які зміни**, спричинені вірусом папіломи людини.

ЩО ТАКЕ АНАЛІЗ НА ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЛ)?

Аналіз на ВПЛ проводиться на матеріалі, відібраному так само, як для тесту Папаніколау, і **перевіряє наявність** певних типів **вірусу папіломи (ВПЛ високого ризику)**, що є збудниками дуже поширеної інфекції, яка передається статевим шляхом. Більшість жінок одужують від цієї хвороби спонтанно (ефективного лікування немає), але вірус, якщо він залишається, з меншості випадків може викликати ураження шийки матки, які можуть повільно перерости в рак.

ЧОМУ АНАЛІЗ НА ВПЛ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КРАЩИЙ ЗАХИСТ, НІЖ ТЕСТ ПАПАНІКОЛАУ?

Численні дослідження продемонстрували, що, порівняно з тестом Папаніколау, аналіз на ВПЛ **виявляє більше уражень шийки матки на більш ранніх етапах**. Тому достатньо проходити його кожні п'ять років, на відміну від тесту Папаніколау, який рекомендовано виконувати кожні три роки.

ЧОМУ АНАЛІЗ НА ВПЛ РЕКОМЕНДУЮТЬ ПРОВОДИТИ ЛИШЕ З 30-РІЧНОГО ВІКУ?

Це пояснюється тим, що з жінок молодшого віку інфекції ВПЛ є дуже поширеними, але з **переважній більшості випадків пацієнтки одужують без лікування**. Скринінг на ВПЛ з жінок віком до 30 років веде до виявлення, а потім лікування уражень, які і без того зникли б спонтанно.

Завдяки ефективному захисту, забезпечуваному вакциною проти ВПЛ, усі дівчата, **народжені після 1998 р. включно**, які отримали дві дози вакцини до досягнення віку 15 років, будуть запрошуватися на **перший скринінговий аналіз з 30-річному**, а не з 25-річному віці.

ВИ НЕ БУЛИ ВАКЦИНОВАНІ ПРОТИ ВПЛ, І ВАШ ВІК ВІД 25 ДО 29 РОКІВ?

ТЕСТ ПАΠΑНИКОЛАУ

НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ТЕСТУ ПАПАНИКОЛАУ

ВІДПОВІДЬ
НАДСИЛАЄТЬСЯ
ПОШТОЮ/ВНОСИТЬСЯ
У ЕЛЕКТРОННУ
МЕДИЧНУ
КАРТКУ

ЗАПРОШЕННЯ НА
ПОВТОРНИЙ ТЕСТ
через 3 роки

ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ТЕСТУ ПАПАНИКОЛАУ




КОЛЬПОСКОПІЯ*

*Кольпоскопія — це безкоштовне і безболісне обстеження для виявлення будь-яких уражень, які потребують лікування.

Скринінг не дозволяє виявляти інші гінекологічні хвороби: звертайте увагу на появу будь-яких симптомів або скарг і за необхідності консультуються з лікарем.

ЧОМУ ЗАЗНАЧЕНИЙ ВІК ВІД 30 ДО 64 РОКІВ?



СКРИНІНГ ВИЯВЛЯЄ:

- 1 позитивний результат аналізу на ВПЛ **на кожні 12** протестованих жінок
- 1 передракове утворення **на кожні 132** протестовані жінки
- 1 пухлину **на 5000** протестованих жінок

Прийдіть на прийом до лікаря:
це п'ять хвилин, але однією проблемою менше.

ШУКАЄТЕ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ?

Відвідайте сторінку



Ви також можете зателефонувати нам



з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 18:00
в суботу: з 8:00 до 13:00