Vaccinées contre le HPV

UN CHOIX RESPONSABLE

PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DES CANCERS POUR :

- **les jeunes femmes (18 - 26 ans)**
- **les femmes ayant reçu un traitement pour des lésions liées aux HPV**
- **les femmes infectées par le VIH**

QU'EST-CE QUE LE PAPILLOMAVIRUS (HPV) ?

Il s'agit d'un groupe de virus très répandus ; il en existe plus de 100 sérotypes, dont plus de 40 peuvent provoquer des infections de l'appareil génital féminin et masculin. Généralement, les infections à HPV sont transitoires, asymptomatiques (c'est-à-dire que la personne ne se rend compte de rien) et dans la plupart des cas guérissent spontanément. Certains sérotypes de HPV peuvent provoquer des verrues tandis que d'autres, dits à haut risque cancérogène, peuvent entraîner des modifications cellulaires des muqueuses du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, de l'anus, du pénis et de l'oropharynx qui, si elles persistent et ne sont pas soignées, peuvent parfois évoluer en tumeur. Plusieurs années peuvent s'écouler entre l'infection et le développement de la tumeur.

QUELS SONT LES VIRUS HPV À HAUT RISQUE CANCÉROGÈNE ET QUE PROVOQUENT-ILS ?

Les virus HPV 16 et 18 sont les principaux responsables des tumeurs et causent à eux seuls plus de 70 % des tumeurs du col de l'utérus. En prenant également en considération d'autres sérotypes comme le 31, le 33, le 45, le 52 et le 58, on atteint 90 % des tumeurs du col de l'utérus et environ 80 % des autres tumeurs liées aux HPV. Le cancer du col utérin a été le premier cancer reconnu par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant totalement imputable à une infection virale.

COMMENT SE TRANSMET LE PAPILLOMAVIRUS ?

Le papillomavirus se transmet à travers le contact intime avec la peau ou les muqueuses, et notamment durant les rapports sexuels, y compris interrompus. Il s'agit de l'infection transmise par voie sexuelle la plus commune. L'utilisation du préservatif réduit, mais n'empêche pas, la transmission du virus, étant donné qu'il peut être présent à d'autres endroits de la peau non protégés par le préservatif.

COMMENT DIAGNOSTIQUER ET SOIGNER L'INFECTION À PAPILLOMAVIRUS ?

Il n'existe pas de traitement spécifique contre l'infection. Pour prévenir ou diagnostiquer rapidement les modifications des cellules du col de l'utérus provoquées par le virus HPV, il est nécessaire d'exécuter régulièrement un dépistage grâce au test HPV ou par le biais d'un frottis. De cette façon, il est possible de diagnostiquer à temps la formation d'anomalies suspectes au niveau des muqueuses du col de l'utérus. Pour les autres sites (vulve, vagin, anus, pénis et oropharynx), il n'existe pas de programme de dépistage, par conséquent, si vous pensez être à risque d'infection, consultez votre médecin traitant ou un spécialiste.

LE VACCIN EST-IL SÛR ? COMMENT EST-IL FAIT ?

Le vaccin est sûr. Il ne contient pas de virus vivant et, par conséquent, ne peut pas provoquer l'infection, mais il est à même d'induire une réponse immunitaire contre le virus. Les nombreuses études menées jusqu'à présent, ainsi que les systèmes de surveillance post-marketing de tous les pays européens et non européens, ont démontré que le vaccin était bien toléré. Des millions de personnes ont été vaccinées contre le HPV et aucune réaction grave n'a été signalée. Il est cependant possible que se manifestent douleur et rougeur au niveau de la zone d'injection, fièvre, nausée, vertiges, maux de tête et douleurs articulaires.

LE VACCIN EST-IL EFFICACE ?

Oui, le vaccin est efficace. Il n'est pas nécessaire d'exécuter le test HPV avant la vaccination. Des études récentes montrent que le vaccin peut prévenir les récidives chez les femmes qui ont déjà contracté le virus et développé des lésions précancéreuses ou cancéreuses, s'il est administré dans les 12 mois qui suivent le traitement.

LE VACCIN CONTRE LE HPV EMPÊCHE-T-IL L'INFECTION ?

Le vaccin empêche l'infection par les sérotypes de HPV contenus dans le vaccin et empêche donc la formation des lésions cellulaires susceptibles d'entraîner un cancer.

QUELLE EST LA DURÉE D'EFFICACITÉ DU VACCIN ?

Les études indiquent la persistance d'anticorps pendant de nombreuses années, probablement pendant toute la vie de la personne vaccinée. En effet, à ce jour aucun rappel n'est prévu après le schéma de base.

À QUI S'ADRESSE LE VACCIN ?

Le vaccin a pour but de prévenir l'infection, et non de la soigner: **il convient donc de l'administrer avant le contact éventuel avec le virus, c'est-à-dire avant le début des rapports sexuels.** Si la jeune fille ou le jeune homme a déjà été au contact des sérotypes de virus contenus dans le vaccin, l'efficacité est réduite. **Il a été démontré que chez les personnes adultes aussi le vaccin maintient une bonne efficacité,** bien qu'elle diminue avec l'âge en raison de la forte probabilité d'avoir déjà eu des contacts avec les virus HPV au cours de l'activité sexuelle. En outre, les études récentes sur le HPV démontrent que **le vaccin a une importance considérable y compris chez les femmes ayant déjà contracté le virus et développé des lésions cancéreuses ;** en effet, chez ces patientes, le vaccin joue un rôle de prévention des récidives tumorales s'il est administré dans les 12 mois suivant l'intervention d'ablation de ces lésions.

OÙ ET COMMENT EST RÉALISÉ LE VACCIN ?

La vaccination est exécutée par les professionnels de santé des centres de vaccination des unités sanitaires locales. Jusqu'à 15 ans, le schéma vaccinal comprend deux doses. Passé cet âge, trois doses sont prévues. Il s'agit d'injections intramusculaires, généralement au niveau du deltoïde (partie supérieure du bras).

QU'OFFRE LE SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL AUX FEMMES ADULTES ?

Le vaccin actuellement utilisé en Émilie-Romagne est efficace contre 9 types de papillomavirus humain (les sérotypes 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) et offre une protection contre près de 90 % des cancers du col de l'utérus, environ 80 % des autres types de cancers liés au HPV et près de 100 % des condylomes.

La vaccination est offerte :

- **jusqu'à l'âge de 26 ans à toutes les jeunes femmes qui n'ont pas encore été vaccinées contre le HPV; à partir de 2019, les jeunes femmes de 25 ans recevront une invitation pour la vaccination gratuite ;**
- **à toutes les femmes, jusqu'à l'âge de 65 ans, pouvant justifier d'avoir reçu un traitement pour des lésions du col de l'utérus de degré élevé (CIN2+) au cours des 12 derniers mois ;**
- **à toutes les femmes infectées par le VIH, à la demande.**

Pour toutes les personnes adultes exclues de l'offre gratuite, il est possible de recevoir le vaccin auprès des centres de vaccination des unités sanitaires locales, à un tarif préférentiel. Le coût à la charge du patient est considérablement inférieur à celui pratiqué à titre privé et correspond au simple coût du vaccin pour l'unité sanitaire locale, plus le coût de la vaccination selon le barème régional. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser aux services de santé et d'hygiène publique, à un dispensaire ou à votre médecin traitant et/ou gynécologue.

LA VACCINATION PEUT-ELLE ÊTRE EFFECTUÉE PENDANT LA GROSSESSE ?

Le vaccin ne doit pas être administré aux femmes enceintes. Si une jeune femme apprend qu'elle est enceinte après avoir commencé le schéma de vaccination, elle doit attendre la fin de la grossesse avant de le terminer. Les études cliniques effectuées jusqu'à présent n'ont pas démontré de problèmes particuliers pour la femme ni pour le fœtus. Des approfondissements supplémentaires sont toutefois en cours.

SI LA VACCINATION A ÉTÉ FAITE, EST-IL TOUTEFOIS NÉCESSAIRE DE SE SOUMETTRE AU DÉPISTAGE ?

Oui, car le dépistage par test HPV ou frottis permet de mettre en évidence les lésions du col de l'utérus provoquées par d'autres sérotypes de HPV non contenus dans le vaccin.

vaccinazione contro l'HPV

Consultez votre certificat de vaccination dans le dossier médical électronique

Fascicolo Sanitario elettronico

POUR SAVOIR COMMENT FAIRE

fascicolo-sanitario.it

COORDINATION ET SUPERVISION DE LA RÉDACTION :
Angela Lucarelli, Caterina Di Monte

RegioneEmilia-Romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

salute.regione.emilia-romagna.it