

PROTOCOLLO DI APPROPRIATEZZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CRITERI CLINICI DI ACCESSO ALLA PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA (cod. DM 89.7B.9; cod. SOLE 2186.001; descr. VISITA PNEUMOLOGICA)

Le condizioni cliniche appropriate sono state tutte esplicitate nel presente documento, mentre quelle non riportate sono state escluse perché inappropriate.

VISITA PNEUMOLOGICA Invio PS

- Sospetto pneumotorace
- Emottisi/Emoftoe in atto

VISITA PNEUMOLOGICA priorità U (Urgente entro 72 ore)

- Importante riacutizzazione di asma bronchiale
- Insufficienza respiratoria acuta su cronica
- Emottisi/Emoftoe anamnestica recente
- Dolore toracico di sospetta natura pleuro-polmonare (focolaio BP?, Pleurite?)
- Sospetto Versamento Pleurico

VISITA PNEUMOLOGICA priorità B (Breve entro 10 giorni)

- Tosse persistente per oltre tre settimane
- Opacità polmonari di nuovo riscontro all'Rx torace (sospetta neoplasia)
- Dispnea in BPCO o Asma non responsive al trattamento (può essere prescritta in associazione alla spirometria semplice)
- Riacutizzazione patologie croniche senza insufficienza respiratoria (SaO₂ > 94%)
- Dispnea di recente insorgenza in assenza di nota patologia polmonare (può essere prescritta in associazione alla spirometria semplice)

VISITA PNEUMOLOGICA priorità D (Differibile entro 30 giorni)

- Sospetta Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) con sonnolenza diurna
- Sospetta pneumopatia infiltrativa diffusa
- Sospetto di asma bronchiale (può essere prescritta in associazione alla spirometria semplice)
- Valutazione pneumologica in paziente con patologia neuromuscolare
- Sospetta BPCO
- Polmoniti ricorrenti

- Dispnea da sforzo (può essere prescritta in associazione alla spirometria semplice)
- Altre condizioni cliniche: da esplicitarsi accuratamente nel quesito diagnostico *

VISITA PNEUMOLOGICA priorità P (Programmabile entro 120 giorni)

- Sospetta Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) senza sonnolenza diurna
- Altre condizioni cliniche: da esplicitarsi accuratamente nel quesito diagnostico *.

*ALTRE CONDIZIONI CLINICHE (Attenzione: tutte le condizioni di appropriatezza sono già elencate nelle altre voci: non utilizzare se non strettamente necessario)