

# PROTOCOLLO DI APPROPRIATEZZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONE EMILIA ROMAGNA

## CRITERI CLINICI DI ACCESSO ALLA PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA (cod. DM 89.7A.9; cod. SOLE 2163.001; descr. VISITA GASTROENTEROLOGICA)

### VISITA GASTROENTEROLOGICA Invio PS

- Indicazioni cliniche non previste

### VISITA GASTROENTEROLOGICA priorità U (Urgente entro 72 ore)

- Indicazioni cliniche non previste

### VISITA GASTROENTEROLOGICA priorità B (Breve entro 10 giorni)

- Calo ponderale significativo non intenzionale con sintomi digestivi comparsi negli ultimi 6 mesi
- Disfagia in prima presentazione (presente da almeno 5-7 giorni)
- Epatopatia cronica nota in fase di scompenso (edemi declivi, ascite) o sospetto clinico, laboratoristico, strumentale di epatopatia
- Sospetto clinico e laboratoristico di malattie infiammatorie croniche intestinali
- Sospetto clinico e/o strumentale di neoplasia dell'apparato digerente
- Sospetto clinico e/o strumentale di patologia biliopancreatica (no colecisti)
- Vomito ricorrente (presente da almeno 5-7 giorni) con esclusione di cause di natura infettiva, metabolica, neurologica e psicogena
- Sospetto di malattie infiammatorie croniche intestinali (**PEDIATRICA**)

### VISITA GASTROENTEROLOGICA priorità D (Differibile entro 30 giorni)

- Anemia sideropenica di sospetta origine gastroenterologica e anemia macrocitica
- Diarrea cronica
- Dolore toracico non cardiaco in soggetti > 50 anni
- Ipertransaminasemia (già indagata con ecografia addominale)
- Sindrome dispeptica dolorosa, già indagata con ecografia e EGDS, in soggetti > 50 anni resistenti a terapia
- Malattia celiaca e/o malassorbimento (già indagata con sierologia specifica e EGDS)
- Disturbi epato correlati
- Deficit accrescitivo staturo-ponderale (**PEDIATRICA**)
- Altre condizioni cliniche: da esplicitarsi accuratamente nel quesito diagnostico \*.

### **VISITA GASTROENTEROLOGICA priorità P (Programmabile entro 120 giorni)**

- Paziente < 50 anni con dolori addominali e alterazioni dell'alvo
- Paziente con sindrome da reflusso gastroesofageo o sindrome dispeptica
- Altre condizioni cliniche: da esplicitarsi accuratamente nel quesito diagnostico \*.

\*ALTRE CONDIZIONI CLINICHE (Attenzione: tutte le condizioni di appropriatezza sono già elencate nelle altre voci: non utilizzare se non strettamente necessario)