

## **PROTOCOLLO DI APPROPRIATEZZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONE EMILIA ROMAGNA**

### **CRITERI CLINICI DI ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGDS)**

**(cod. DM 45.13; cod. SOLE 0441.001; descr. ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA)**

I codici seguenti saranno oscurati in quanto procedure da effettuarsi eventualmente in corso di EGDS e quindi utilizzati in sede di erogazione.

- (ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE UNICA - Codice 45.16.1 )
- (ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA - Codice 45.16.2)
- (ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA DELL'ESOFAGO - Codice 42.24)

### **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Invio PS**

- Indicazioni cliniche non previste

### **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA priorità U (Urgente entro 72 ore)**

- Indicazioni cliniche non previste

### **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA priorità B (Breve entro 10 giorni)**

- Anemia normo-microcitica (Hb < 10 g/dl) di nuova diagnosi
- Calo ponderale significativo con sintomi digestivi
- Disfagia (presente da almeno 5-7 giorni)
- Sospette neoplasie rilevate obiettivamente e/o con imaging
- Vomito ricorrente (presente da almeno 5-7 giorni) con esclusione di cause di natura infettiva, metabolica, neurologica e psicogena

### **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA priorità D (Differibile entro 60 giorni)**

- Anemia sideropenica o macrocitica
- Pazienti > 50 anni con sindrome da reflusso gastroesofageo o sindrome dispeptica dolorosa di recente insorgenza (< 6 mesi), persistente (> 4 settimane) o non responsivi alla terapia (mai indagata con EGDS)
- Conferma di celiachia in pazienti con sierologia positiva
- Stadiazione pre-trapianto
- Accertamento presenza varici/gastropatia da ipertensione portale
- Diagnosi laboratoristica non risolutiva di celiachia (su indicazione specialista gastroenterologo)
- Altre condizioni cliniche: da esplicitarsi accuratamente nel quesito diagnostico \*.

## **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA priorità P (Programmabile entro 120 giorni)**

- Pazienti < 50 anni con sindrome da reflusso gastroesofageo o sindrome dispeptica (mai indagata con EGDS) con sintomi persistenti anche dopo test and treat per HP
- Altre condizioni cliniche: da esplicitarsi accuratamente nel quesito diagnostico \*.

\*ALTRE CONDIZIONI CLINICHE (Attenzione: tutte le condizioni di appropriatezza sono già elencate nelle altre voci: non utilizzare se non strettamente necessario)