

Centro	Codice Paziente	Nome Cognome	Data di nascita	Data di reg.
			__/__/__	__/__/__

Eleggibili solo pazienti con età > 18 anni

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
- Cimzia -

• Cimzia, in combinazione con metotressato (MTX), e' indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) attiva di grado da moderato a grave in pazienti adulti quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs), incluso il metotressato, sia risultata inadeguata. Cimzia puo' essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando un trattamento continuativo con metotressato sia inappropriato. Cimzia ha mostrato di ridurre la velocita' di progressione del danno articolare valutato radiograficamente e di migliorare la funzione fisica quando somministrato in combinazione con metotressato. Vai al testo della determinazione:

DIAGNOSI

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

	Data valutazione*	/____/____(gg mm aaaa)
(E)	Diagnosi*	Artrite Reumatoide attiva da moderata a grave Altro (NON ELEGGIBILE)
(E)	Precedenti terapie con farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)	Si No (NON ELEGGIBILE)
	Se si', specificare tra questi principi attivi	FANS Ciclosporina Methotrexate Cortisonici
	Se si' indicare la risposta al trattamento	Assenza di risposta Intolleranza
	Il farmaco verra' utilizzato in associazione a Metotrexato*	Si No
	Se NO, Motivazione	Intolleranza a MTX Inappropriatezza del trattamento con MTX
	Precedenti terapie con farmaci antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF) *	Si No
(E)	Se si', specificare tra questi principi attivi	Etanercept Adalimumab Infliximab Altro (NON ELEGGIBILE)
	Tattamento precedente con farmaci anti TNF chiuso per	Fallimento Tossicita'
(E)	Altri farmaci in associazione (oltre al Metotrexato) per il trattamento dell'Artrite reumatoide?*	Si No (NON ELEGGIBILE)
Per approfondimenti su altri criteri e parametri di eleggibilita' del paziente, consultare la scheda tecnica del farmaco.		