

DIAGNOSI

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
- HERCEPTIN neoplasie gastriche -

Herceptin in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino e' indicato nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2-positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica.

Herceptin deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+.

Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati.

I campi contrassegnati dalla lettera (E) sono determinanti per l'eleggibilità.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

(E)	Diagnosi*	Adenocarcinoma gastrico Adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea Altro
	se altro, specificare	_____
(E)	Fase della malattia all'inizio del trattamento *	metastatica localmente avanzata : Altro
(E)	Performance status alla diagnosi (ECOG)* :	0 1 2 3 4
(E)	Linea di trattamento* :	I II successiva
Status HER2		
(E)	Immunoistochimica*:	Si No
(E)	FISH/SISH*:	Positivo Negativo Non eseguito
	Se si, quale fluoro-pirimidina verra' utilizzata?:	Capecitabina 5-fluorouracile
Funzionalita' cardiologia		
(E)	FEVs*:	_____ %



Anamnesi cardiologica*:	Ipertensione Arteriopatia coronaria documentata Insufficienza cardiaca sintomatica Aritmie Altro
se altro, specificare	_____
Data di valutazione*:	__/__/__ (gg/mm/aaaa)