

## DIAGNOSI

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE  
- JAVLOR -**

Javlor e' indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule transizionali del tratto uroteliale avanzato o metastatico dopo fallimento di un precedente regime contenente platino.

**I campi contrassegnati dalla lettera (E) sono determinanti per l'eleggibilità.  
I campi contrassegnati con \* sono obbligatori.**

<b>(E)</b>	Diagnosi*	Carcinoma a cellule transazionali del tratto uroteliale Altro
	se altro, specificare	_____
<b>(E)</b>	Fase della malattia all'inizio del trattamento *	localmente avanzato metastatico : Altro
<b>(E)</b>	Performance status (ECOG)* :	0 1 2 3 4
	Linea di trattamento* :	I II successive
<b>(E)</b>	Fallimento di un precedente regime contenente platino *	Si No
<b>(E)</b>	Verra' utilizzato in* :	Monoterapia Combinazione con chemioterapia
	Precedente irradiazione pelvica* :	Si No
	Data di valutazione* :	__/__/__ (gg/mm/aaaa)

 \_\_\_\_\_  
 Nome del Medico

 \_\_\_\_\_  
 Data

 \_\_\_\_\_  
 Firma