

DIAGNOSI

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE
- NPLATE -**

- Nplate e' indicato in pazienti adulti affetti da porpora trombocitopenia immunitaria (idiopatica) cronica (PTI) splenectomizzati che sono refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline). Nplate puo' essere preso in considerazione come trattamento di seconda linea nei pazienti adulti non splenectomizzati per i quali l'intervento chirurgico e' controindicato..

**I campi contrassegnati dalla lettera (E) sono determinanti per l'eleggibilità.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.**

	Data valutazione*	____/____/____(gg mm aaaa)
(E)	Diagnosi*	Porpora trombocitopenica immunitaria (idiopatica) cronica Altro
(E)	Conta piastrinica	_____
	Paziente splenectomizzato*	Si No
(E)	Se NO indicare il motivo*	Intervento controindicato Rifiuto da parte del paziente Altro
	Il paziente e' stato gia' trattato con Nplate?	Si No
	Se si':	
	n. di iniezioni effettuate	_____
(E)	Paziente (splenectomizzato o non) refrattario ad altri trattamenti precedenti	Si No
	Se si' indicare quali	<input type="checkbox"/> trattamento di prima linea <input type="checkbox"/> trattamento di seconda linea
	Se trattamento di prima linea, specificare	Ig anti D Corticosteroidi IVIg

REGISTRO DEI FARMACI ORFANI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO

Se trattamento di seconda linea e/o successivi, specificare	Ig anti D Corticosteroidi IVIg azatioprina ciclosporina A ciclofosfamide rituximab splenectomia agonisti recettoriali TPO alcaloidi della vinca Altro
Paziente già trattato con altri agonisti recettoriali TPO	Sì No
Se Sì indicare il motivo dello switch	Intolleranza Refrattarietà Perdita di risposta compliance Altro
(E) Linea di trattamento	Prima Seconda Successive
Altri trattamenti concomitanti per la PTI	Sì No
Se Sì indicare quali	Azatioprina Corticosteroidi Danazolo Immunoglobuline ev Immunoglobuline anti D Altro
Paziente est asiatico	Sì No