

**PROLIA**
**DIAGNOSI**
**INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa ad aumentato rischio di fratture. Prolia riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore.

Informazioni più dettagliate su PROLIA sono disponibili sul [sito web dell'Agenzia Europea dei Medicinali](#) e nella sezione [Normativa del Registro PROLIA](#).

**I campi contrassegnati dalla lettera (E) sono determinanti per l'eleggibilità.  
I campi contrassegnati con \* sono obbligatori.**

Data valutazione\* \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_(gg mm aaaa)

(E) Diagnosi\* Osteoporosi post-menopausale con aumentato rischio di fratture  
Altro

(E) Pregresse fratture osteoporotiche vertebrali o di femore\* Si  
No

(E) Valori di T-score della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno < -4,0 (o < -5,0 per ultrasuoni falangi),  
oppure  
valori di T-score della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno < -3,0 (o < -4,0 per ultrasuoni falangi) e con almeno uno dei seguenti fattori di rischio aggiuntivi:  
- storia familiare di fratture vertebrali e/o di femore;  
- artrite reumatoide e altre connettiviti  
- pregressa frattura osteoporotica al polso  
- menopausa prima 45 anni di eta'  
- terapia cortisonica cronica\*

Si  
No

Paziente già trattato con farmaci inclusi nella nota 79\* Si  
No

Se si' indicare quali

Acido alendronico  
Acido risedronico  
Acido ibandronico  
Acido alendronico/Vitamina D3  
Raloxifene  
Bazedoxifene  
Ranelato di stronzio  
teriparatide  
Ormone paratiroideo

\_\_\_\_\_  
Nome del Medico

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Firma