



- Legga il foglio illustrativo di RoACTEMRA (Tocilizumab) per avere maggiori informazioni.
 - Mostri questa scheda a tutti i medici che si occupano di lei.
- Questa scheda di allerta per il paziente contiene importanti informazioni di sicurezza che deve conoscere prima che venga somministrato RoACTEMRA (Tocilizumab) e durante il trattamento con RoACTEMRA (Tocilizumab).

Scheda di Allerta per il Paziente su RoACTEMRA (Tocilizumab)

Date della terapia con RoACTEMRA (Tocilizumab):

Inizio: _____

La più recente: _____

Si accerti di portare con sé, in occasione delle visite dallo specialista, anche un elenco di tutti gli altri medicinali che assume.

Nome del paziente: _____

Nome del medico: _____

Telefono del medico: _____

Porti con sé questa scheda fino a 3 mesi dopo aver ricevuto l'ultima dose di RoACTEMRA (Tocilizumab), in quanto gli effetti indesiderati possono manifestarsi per un certo tempo dall'ultima dose di RoACTEMRA (Tocilizumab).

Infezioni

RoACTEMRA (Tocilizumab) aumenta il rischio di sviluppare infezioni che possono divenire gravi se non trattate.

- Non deve essere trattato con RoACTEMRA (Tocilizumab) se ha una infezione grave.
- Prima di iniziare il trattamento con RoACTEMRA (Tocilizumab) lei deve essere stato sottoposto al test per la tubercolosi.
- Parli con il medico di eventuali vaccinazioni di cui potrebbe aver bisogno prima di iniziare il trattamento con RoACTEMRA (Tocilizumab).
- Se al momento del successivo trattamento presenta un'infezione di qualche tipo (anche un semplice raffreddore), l'infusione dovrà essere rimandata a quando si sentirà meglio.

- Si rivolga immediatamente al medico se sviluppa sintomi quali febbre, tosse persistente, perdita di peso, mal di gola, respiro sibilante, formazione di vesciche arrossate o tumefatte sulla pelle, lacrimazione, ferite, forte debolezza o stanchezza.

Complicanze della diverticolite

I pazienti che assumono RoACTEMRA (Tocilizumab) possono sviluppare complicanze della diverticolite che possono divenire gravi se non trattate.

- Si rivolga immediatamente al medico se manifesta mal di stomaco, coliche o se nota la presenza di sangue nelle feci.