

Carta di Allerta per il Paziente che usa TYSABRI

Questa Carta di Allerta per il Paziente contiene importanti informazioni di sicurezza che lei deve conoscere prima di prendere TYSABRI e durante il trattamento con TYSABRI.

Prima del trattamento con TYSABRI

Lei non dev'essere trattato con TYSABRI se ha un grave problema a carico del sistema immunitario
Lei non deve prendere altri medicinali a lungo termine per la sua sclerosi multipla durante il trattamento con TYSABRI

Durante il trattamento con TYSABRI

Vi sono state segnalazioni di una rara infezione cerebrale denominata PML (leucoencefalopatia multifocale progressiva) verificatasi in pazienti che hanno assunto TYSABRI. La PML solitamente provoca disabilità e può risultare fatale.

I sintomi della PML possono essere simili a quelli di una recidiva di SM. Pertanto, se lei ritiene che la sua SM stia peggiorando oppure se nota qualche sintomo nuovo, è importante che lei si rivolga al suo medico curante il più presto possibile.

Discuta la sua terapia con il suo coniuge o con coloro che l'assistono. Essi potrebbero notare dei nuovi sintomi di cui lei non si rende conto.

Si possono verificare gravi infezioni con TYSABRI. Se lei pensa di avere un'infezione si rivolga al suo medico al più presto possibile e gli mostri questa tessera ed il foglio illustrativo. I sintomi d'infezione comprendono:
febbre inspiegabile,
diarrea grave,
difficoltà respiratoria,
capogiri prolungati,
cefalea,
torcicollo,
perdita di peso,
apatia

Mostri questa tessera ad ogni medico coinvolto nella sua terapia, non soltanto al suo neurologo.
Per ulteriori informazioni consulti il foglio illustrativo per il paziente di TYSABRI.

Conservi questa tessera con sé per 6 mesi dopo l'ultima dose di TYSABRI, poiché possono verificarsi effetti collaterali anche dopo la sospensione del trattamento con TYSABRI.

Nome del paziente: _____

Nome del medico: _____

Numero telefonico del medico: _____