

**Epidemiologia delle  
malattie trasmesse da alimenti  
in Emilia-Romagna**  
*Periodo 1988-2006*

A cura di: Bianca Maria Borrini, Andrea Mattivi, Lucia Droghini, Alba Carola Finarelli, Erika Massimiliani,  
Laura Moschella

Servizio Sanità Pubblica – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Regione Emilia-Romagna

# **LA SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA Periodo 1988-2006**

**Servizio Sanità Pubblica  
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali  
Regione Emilia-Romagna**

## **Premessa**

Dal 1988 la Regione Emilia-Romagna aderisce al Sistema di Sorveglianza degli episodi epidemici di Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA), promosso in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità.

Il sistema di sorveglianza, fin dal 1988, è stato caratterizzato dalla raccolta di dati relativi agli episodi (o focolai) epidemici di MTA definiti come "due o più casi di malattia correlati al consumo di un alimento comune". Unica eccezione a tale definizione sono stati i casi di intossicazione alimentare (botulismo tra le eziologie infettive, intossicazioni da tossine marine o da sostanze chimiche) per cui anche un solo caso è stato considerato focolaio epidemico.

L'analisi dei dati del sistema di sorveglianza fornisce indicazioni sugli agenti patogeni, sulle modalità di trasmissione, sulle persone esposte e con sintomi, sui fattori di rischio associati con le MTA, e permette di formulare indirizzi in relazione agli interventi di prevenzione e controllo.

Durante il periodo 1988-2006 si sono verificati nel territorio regionale 1.917 episodi epidemici di MTA. Nell'ultimo decennio (1997-2006) in media si tratta di poco meno di 100 episodi all'anno con circa 650 persone che annualmente hanno accusato sintomi; il tasso medio annuo di incidenza di MTA è quindi di circa 2 su 10.000 abitanti.

Se proviamo a rapportare i casi di malattia registrati annualmente in strutture di ristorazione pubblica e collettiva alle persone davvero esposte al rischio di MTA in tale ambito, considerando solo chi abitualmente consuma a pranzo pasti fuori casa (dati desunti dall'indagine multiscopo annuale Istat sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 2006 - "Stili di vita e condizioni di salute"), il rischio di malattia per MTA nell'anno 2006 risulta inferiore ad 1 caso (0,27 casi) su 1.000.000 di occasioni di esposizione, quando il valore medio negli ultimi 10 anni è di poco superiore (0,41 casi su 1.000.000 di occasioni di esposizione) Questa considerazione non vuole minimizzare la rilevanza del problema, ma vuole collocarlo in una più corretta scala di riferimento rispetto ad altre problematiche di salute pubblica.

L'evidente incremento del numero di episodi di MTA notificati nella prima metà degli anni '90 rispetto alla fine degli anni '80, è in parte attribuibile ad un aumento reale delle tossinfezioni registrato anche a livello nazionale e internazionale, ma è legato anche ad una modifica del sistema di segnalazione (D.M. Sanità del 15/12/1990) che ha prodotto un incremento della sua sensibilità per una maggiore attenzione al problema da parte degli operatori sanitari e della popolazione.

Non va dimenticato, tuttavia, che il sistema di sorveglianza sottostima gli episodi avvenuti nelle abitazioni private, quelli che hanno comportato sintomatologia lieve o quelli per i quali non è stato possibile ricostruire una fonte comune (es. a seguito di consumo da

rosticceria o gelateria, etc). È difficile stimare l'entità della sottonotifica che, per di più, varia anche all'interno del periodo considerato. Si può invece affermare che il sistema di sorveglianza è certamente affidabile per quanto riguarda gli episodi occorsi in strutture di ristorazione collettiva, in particolare in quelle a rischio (strutture per anziani, asili nido, ospedali). Per approfondire il tema delle tossinfezioni alimentari, che sempre più spesso viene determinato da comportamenti non idonei presso gli stessi ambienti domestici, è stata predisposta una sezione apposita all'interno dello Studio Passi 2006. Questo studio permette di indagare alcuni punti che non vengono considerati dal sistema di sorveglianza, come la frequenza di assunzione di cibi a rischio crudi o poco cotti, l'occorrenza di episodi di diarrea e il grado di attenzione prestato alle etichette al momento dell'acquisto di generi alimentari; si rimanda pertanto al report in corso di predisposizione sullo studio effettuato nel 2006.

### **Andamento spazio-temporale**

Il **grafico 1** mostra il totale degli episodi di MTA per anno di insorgenza con la suddivisione tra episodi da Salmonella e da altri agenti eziologici. Negli ultimi anni si osserva una forte e costante riduzione sia degli episodi totali di MTA, sia degli episodi di Salmonella. Escludendo i casi dell'anno 2005, anno in corrispondenza del quale si è osservato un deciso decremento di tutti gli episodi (-50% circa), dovuto probabilmente alla naturale oscillazione della serie storica del fenomeno più che a cambiamenti nella sensibilità del sistema di sorveglianza o a cambiamenti strutturali del fenomeno stesso, è comunque ragionevole identificare un trend negativo degli episodi a partire dal 2001, soprattutto per quanto riguarda il numero di episodi da Salmonella.

La **tabella 1** riporta il numero dei focolai epidemici di MTA ed il numero dei focolai epidemici da Salmonella suddivisi per anno e per Azienda USL, evidenziando la percentuale di episodi determinati da Salmonella sul totale. In particolare si osserva che il numero di episodi si è ridotto in modo omogeneo tra le Aziende e che la proporzione di focolai da Salmonella sul totale si è ridotta di quasi 20 punti percentuali nell'ultimo biennio rispetto al biennio precedente (2003-2004) e di 56 punti percentuali rispetto al biennio 1997-1998.

Analizzando la distribuzione per mese d'insorgenza degli episodi di MTA totali e da Salmonella, si conferma la maggiore incidenza di episodi nel periodo maggio-ottobre, mentre le intossicazioni da funghi si concentrano nei mesi di settembre-novembre (**grafico 2**).

### **Soggetti esposti e malati**

Tra il 1988 e il 2006 nel territorio regionale complessivamente 16.050 soggetti sono stati affetti da MTA, a fronte di un numero di persone "esposte" pari a 44.687 (**tabella 2**). Il termine "esposte" viene qui utilizzato per indicare le persone che hanno consumato cibi in occasione dell'episodio di tossinfezione alimentare.

La proporzione dei malati rispetto agli esposti è molto variabile, passando, nel periodo considerato, da un minimo di 11,3% (1989) e un massimo di 62,9% (2005). La frequenza media negli ultimi 19 anni è pari al 35,9%. Appare in diminuzione la proporzione di soggetti ospedalizzati rispetto ai malati, dal 31% nel 1988 al 9% nel 2006.

Il **grafico 3** mostra i soggetti malati evidenziando la quota di ricoverati. La percentuale di ricoverati tra le persone che hanno accusato sintomi risulta nel periodo considerato pari al 17,1%. Sono stati registrati 19 decessi, concentrati principalmente negli

anni 1991-1994, con un tasso di letalità (proporzione di deceduti fra i malati) pari a 1,2 per 1.000 nei 19 anni osservati; 16 di tali decessi (84%) hanno riguardato persone affette da salmonellosi. Dal 1998 non si registrano decessi tra i malati.

### **Agenti eziologici di MTA**

Per 1.666 episodi epidemici di MTA (86,9% del totale) è stato possibile risalire ad una eziologia certa: agenti infettivi hanno determinato 1.523 episodi (79,4% sul totale) di cui 1.317 da Salmonella (68,7%), mentre agenti tossici hanno determinato 143 episodi (7,5%) di cui 117 da funghi. Per 251 episodi (13,1% del totale) non è stato possibile individuare l'agente eziologico (**tabella 3, grafico 4**).

La causa più rilevante di focolai epidemici è rappresentata quindi nella regione dalle infezioni da Salmonella; il gruppo D e il sierotipo Enteritidis provocano in media il 71,7% delle MTA da Salmonella, con un andamento variabile negli anni, anche se mai inferiore al 40% degli episodi totali. Solo nel 2005 si è evidenziata un'inversione di tendenza, con la prevalenza di Salmonella di tipo B, che ha causato 7 episodi su 13 (54%). Nel 2006 le infezioni da Salmonella di gruppo D e sierotipo Enteritidis sono il 33%, confermando l'ipotesi di una variabilità degli ultimi anni legata alla ridotta numerosità degli episodi osservati. Gli episodi provocati da Salmonella non tipizzata nel periodo considerato sono in media 4,1. (**tabella 4, grafico 5**).

### **Sede di preparazione dell'alimento**

Il luogo di preparazione dell'alimento veicolo di MTA è nel 68,5% degli episodi la casa privata; seguono le sedi di ristorazione pubblica (ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar) per il 21,9% degli episodi, le rosticcerie e gli stand gastronomici per il 2,9%, le sedi di ristorazione collettiva per "altri gruppi" (mense aziendali, universitarie e mense scolastiche delle elementari e medie) per il 2,5% ed infine le sedi di ristorazione collettiva per gruppi a rischio (case protette per anziani, ospedali e mense di asili nido e scuole materne) per il 2,2%.

L'analisi delle persone malate coinvolte per le diverse "sedi di preparazione" degli alimenti mostra che su un totale di 16.050 casi: 5.720 malati (35,6%) hanno consumato alimenti preparati in sedi di ristorazione pubblica, con una media di quasi 14 casi per episodio; 5.157 malati (32,1%) hanno consumato alimenti preparati in case private con una media di 3,9 casi per episodio; 3.136 (19,5%) malati hanno consumato alimenti preparati in sedi di ristorazione collettiva per gruppi a rischio con una media di 74,6 casi per episodio (a questo proposito occorre sottolineare che, escludendo l'episodio avvenuto nel 1994 nelle mense scolastiche del Comune di Bologna, che ha interessato più di 2.000 soggetti, il numero medio di casi per episodio si abbassa a 20,3); 1.373 (8,6%) casi hanno avuto origine in sedi di mense aziendali o universitarie con una media di 29,2 casi per episodio. Sedi di preparazione quali gastronomie e rosticcerie hanno contribuito a determinare 442 casi (2,8%, media di 7,9 casi per episodio) (**tabelle 5, 5a, 5b e grafici 6 e 7**).

Anche valutando separatamente gli episodi epidemici di MTA determinati da Salmonelle, si può evidenziare come il maggior numero di focolai derivi da alimenti preparati in casa privata (74,5%), mentre il 17,2% degli episodi ha avuto origine da alimenti confezionati in sedi di ristorazione pubblica. Il 2,8% degli episodi è stato originato da alimenti preparati in gastronomie e rosticcerie, mentre solo l'1,7% da alimenti preparati in mense aziendali e universitarie ed il 2,1% in sedi di ristorazione collettiva per gruppi a

rischio. Si deve inoltre osservare che, pur essendo più elevato il numero totale di episodi e di persone malate in casa privata, il numero di persone coinvolte in un singolo episodio in sede di ristorazione collettiva per gruppi a rischio è 25 volte maggiore (104) rispetto a quello osservato in case private (4,1) (**tabella 6, 6a, 6b e grafici 8 e 9**).

### **Veicoli di trasmissione dell'infezione**

Tra i veicoli individuati come responsabili delle MTA al primo posto compaiono gli alimenti contenenti uova (in 981 episodi pari al 51,2% sul totale), seguono i prodotti carnei (178 episodi) e il pesce (140 episodi). In 118 episodi il veicolo individuato è rappresentato dai funghi (**tabella 7 e grafico 10**).

E' interessante notare come nell'ambito degli episodi epidemici di MTA da Salmonella (1.299 in totale) gli alimenti contenenti uova rappresentino un veicolo ancora più frequente (921 episodi pari al 71% del totale di episodi di MTA da Salmonella). In particolare per il veicolo "alimenti contenenti uova", alla fine degli anni '90 si è ritenuto di agire con provvedimenti normativi a diversi livelli:

- Ordinanza Presidente della Giunta regionale "Divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura nelle strutture ospitanti categorie a rischio", in vigore annualmente dal 1992;
- Circolari Regionali 38/1993, 42/1994 e 17/2002 relative al controllo veterinario sugli allevamenti avicoli per la prevenzione delle infezioni zoonosiche e la profilassi delle salmonellosi;
- Circolari Regionali 8/1992 e 34/1993 relative agli indirizzi per la conduzione, la vigilanza e il controllo delle attività di ristorazione collettiva e di ristorazione pubblica;
- Indirizzi ed indicazioni operative per il controllo veterinario sugli allevamenti avicoli per la profilassi della salmonellosi;
- Legge Regionale 11/2003, "Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti, abolizione del libretto di idoneità sanitaria";
- Delibera Giunta Regionale 342/2004, "Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato".

Tali provvedimenti sono risultati altamente efficaci in quanto i dati epidemiologici dimostrano una forte riduzione degli episodi di MTA da Salmonella veicolati da alimenti contenenti uova, prima di tutto nelle strutture di ristorazione collettiva per gruppi a rischio (nessun episodio segnalato dall'anno 2000 a oggi) ma anche nelle altre strutture di ristorazione collettiva e nella ristorazione pubblica (**tabella 8 e 9, grafici 11, 12 e 13**).

### **Fattori di rischio implicati nella genesi delle MTA**

I fattori di rischio più comuni implicati nel manifestarsi delle MTA sono evidenziati nei **grafici 14 e 15** e nelle **tabelle 10 e 11** (si specifica che per ogni episodio di MTA possono essere individuati fino a quattro diversi fattori di rischio). I fattori di rischio più importanti sono in ordine progressivo:

- Scorretto mantenimento della temperatura di conservazione dell'alimento (18% degli episodi);
- Cottura inadeguata (18%);
- Consumo di cibo crudo (17%);
- Provenienza incerta dell'alimento (14%);
- "Cattiva igiene dell'alimentarista", intendendo con tale espressione comportamenti igienici scorretti (7%);
- Aver fatto trascorrere più giorni tra preparazione e consumo del cibo (6%);


Solo nell'1% degli episodi di MTA l'alimentarista è risultato colonizzato da germi patogeni implicati nel focolaio epidemico (portatore sano) e, sempre nell'1%, è stata segnalata una scorretta preparazione.

Paragonando i fattori di rischio tra l'ambito della ristorazione pubblica/collettiva (comprendente sia quella offerta nei gruppi a rischio e nella popolazione generale, sia quella nei ristoranti, rosticcerie ecc.) con quelli relativi all'ambito delle case private, si nota che l'ordine di importanza dei singoli fattori risulta lievemente differente. Lo "scorretto mantenimento della temperatura" e la "cottura inadeguata" (oltre alla "cattiva igiene dell'alimentarista") rivestono più importanza nella ristorazione pubblica/collettiva, mentre "la cottura inadeguata", "il consumo di cibo crudo" e "cibo ottenuto da fonti incerte" risultano più significativi nell'ambito delle case private, in sintonia con quanto atteso in base alle ordinanze regionali per il divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, nelle strutture ospitanti categorie a rischio.

E' interessante evidenziare che il consumo di cibo crudo e la cottura inadeguata sono i fattori di rischio principali negli episodi insorti presso abitazioni private (complessivamente il 40% sul totale degli episodi in casa privata), mentre il non corretto mantenimento della temperatura riveste importanza prioritaria nella ristorazione collettiva (25% nella ristorazione collettiva per gruppi a rischio e per altri gruppi, 25% nelle rosticcerie e stand gastronomici, 22% nella ristorazione pubblica).

Se si considerano solo i focolai di MTA da Salmonella, il fattore di rischio prevalente è il consumo di cibo crudo, che incide per il 21% del totale degli episodi; segue la cottura inadeguata (19%), lo scorretto mantenimento della temperatura (17%) ed il cibo ottenuto da fonti incerte (14%) (**grafici 14 e 15, tabelle 10, 11 e 12**).

**Graf. 1 - EPISODI DI MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI PER ANNO**  
**Periodo 1988-2006**




Tab. 1 - EPISODI DI IMTA PER AZIENDA USL E PER ANNO  
Periodo 1988-2006

Aziende USL	NUMERO EPISODI																																																Totale	
	1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		Tot	Salm										
	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm	Tot	Salm										
Piacenza	1	0	4	3	3	3	3	2	1	8	8	6	7	3	2	4	4	5	3	3	3	6	4	2	1	2	2	0	0	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	64	48								
Parma	1	0	0	0	0	0	0	4	3	14	12	8	5	19	11	7	4	8	5	10	6	5	12	7	18	4	14	2	8	2	10	5	4	1	2	1	6	2	151	75										
Reggio Emilia	1	0	1	0	9	5	4	48	48	19	18	29	22	29	17	31	30	34	32	17	16	34	29	18	17	15	10	12	10	9	7	10	7	4	3	5	3	320	278											
Modena	2	0	1	1	2	1	1	27	26	11	27	21	28	27	13	10	19	21	18	23	18	28	23	19	14	8	5	18	15	14	10	13	8	3	1	12	5	275	217											
Bologna	1	0	9	2	5	1	5	2	14	11	11	20	11	29	19	23	29	21	18	7	26	19	13	8	12	2	10	6	11	7	5	2	9	4	4	1	264	156												
Imola	0	0	0	0	0	0	3	2	9	6	15	13	10	7	5	15	13	7	5	7	3	6	6	10	6	1	0	1	2	1	4	3	3	1	4	1	102	72												
Ferrara	0	0	1	1	0	0	2	0	16	12	30	20	28	20	15	10	17	13	13	6	20	13	18	10	12	4	7	2	12	9	4	3	1	1	0	4	1	203	126											
Ravenna	4	3	3	2	8	6	9	7	33	19	16	12	32	17	12	5	23	9	20	11	12	7	11	18	6	7	2	6	4	2	11	3	1	0	7	2	241	128												
Forlì	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	11	10	6	6	0	3	3	6	6	6	3	5	5	7	5	3	1	2	1	2	1	1	2	0	5	1	62	45												
Cesena	2	1	2	1	4	3	5	2	7	6	5	5	2	2	7	4	9	5	12	11	7	4	11	9	4	2	0	2	0	3	1	6	0	1	1	0	90	57												
Rimini	4	3	0	0	0	0	4	4	12	11	14	9	21	20	8	4	8	8	27	23	15	13	10	9	3	3	7	3	1	1	2	1	1	1	3	1	144	115												
Emilia-Romagna	16	7	21	10	31	19	42	26	189	160	167	124	211	154	104	71	168	132	184	142	134	92	173	132	124	70	76	29	73	48	64	42	28	13	52	18	1.917	1.317												

% Episodi da Saimonella sul totale	43,8	47,6	61,3	61,9	84,7	74,3	73,0	68,3	78,6	77,2	68,7	76,3	56,5	38,2	65,8	65,6	46,7	46,4	34,6	68,7
------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


**Graf. 2 - EPISODI DI MTA PER MESE D'INSORGENZA**  
**Periodo 1988-2006**



Tab. 2 - NUMERO DI ESPOSTI , MALATI, OSPEDALIZZATI E DECEDUTI PER ANNO  
Periodo 1988-2006


ANNO	ESPOSTI	MALATI	% malati rispetto agli esposti	OSPEDALIZZATI	% ospedalizzati rispetto ai malati	DECEDUTI	Tassi di letalità per 1.000
1988	1.851	301	16,3	93	30,9	0	0,0
1989	1.915	217	11,3	48	22,1	1	4,6
1990	474	262	55,3	35	13,4	0	0,0
1991	1.268	551	43,5	111	20,1	2	3,6
1992	2.983	1.154	38,7	270	23,4	4	3,5
1993	5.374	1.434	26,7	191	13,3	2	1,4
1994	8.193	3.525	43,0	396	11,2	9	2,6
1995	2.049	810	39,5	95	11,7	0	0,0
1996	2.550	1.332	52,2	230	17,3	0	0,0
1997	4.729	1.379	29,2	329	23,9	1	0,7
1998	2.287	1.037	45,3	229	22,1	0	0,0
1999	2.618	996	38,0	200	20,1	0	0,0
2000	2.103	682	32,4	125	18,3	0	0,0
2001	2.056	517	25,1	107	20,7	0	0,0
2002	906	336	37,1	55	16,4	0	0,0
2003	583	348	59,7	84	24,1	0	0,0
2004	1.174	496	42,2	81	16,3	0	0,0
2005	388	244	62,9	22	9,0	0	0,0
2006	1.186	429	36,2	38	8,9	0	0,0
<b>TOTALE</b>	<b>44.687</b>	<b>16.050</b>	<b>35,9</b>	<b>2.739</b>	<b>17,1</b>	<b>19</b>	<b>1,2</b>

Graf. 3 - NUMERO DI MALATI E OSPEDALIZZATI PER ANNO  
Periodo 1988-2006



**Tab. 3 - EPISODI DI MTA PER AGENTE EZIOLOGICO**  
**Periodo 1988-2006**

	<b>N. EPISODI</b>	<b>%</b>
<b>AGENTE INFETTIVO</b>		
Salmonella spp.	1317	68,7%
Stafilococco enterotossico	59	3,1%
Clostridium perfringens	35	1,8%
Clostridium botulinum	23	1,2%
Escherichia coli	4	0,2%
Brucella	6	0,3%
Virus dell'epatite A	28	1,5%
Shigella	4	0,2%
Listeria	2	0,1%
Altro	45	2,3%
	<b>1523</b>	<b>79,4%</b>
<b>INTOSSICAZIONI</b>		
Funghi	117	6,1%
Sgombrotossina	22	1,1%
Biotossina algale	4	0,2%
	<b>143</b>	<b>7,5%</b>
<b>AGENTE NON IDENTIFICATO</b>		
	<b>251</b>	<b>13,1%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1917</b>	<b>100,0%</b>




\*Nel grafico nella categoria "Altro" sono compresi Escherichia coli, Brucella, Shigella, Listeria ed altri agenti infettivi.

Tab. 4 - EPISODI DI MTA DA SALMONELLA PER ANNO: SIEROGRUPPI E SIEROTIPI ACCERTATI  
Periodo 1988-2006

SALMONELLE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTALE
Salmonelle non tipizzate	0	3	0	6	9	11	12	9	4	0	8	3	1	1	4	2	0	2	2	77
S. Gruppo B	1	1	1	1	16	10	17	4	16	14	4	6	3	6	14	11	4	7	3	139
S. Gruppo C	2	1	1	0	1	1	6	2	4	4	2	6	4	3	4	0	1	1	3	46
S. Gruppo D	2	2	8	6	46	41	32	13	23	30	34	54	27	8	13	16	11	1	4	371
S. Gruppo E	0	0	0	0	0	1	6	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	14
S. Enteritidis	1	2	8	13	82	54	73	32	67	83	43	58	25	6	8	9	6	1	2	573
S. Typhimurium	1	1	0	0	6	6	7	11	13	0	1	3	8	4	5	4	6	0	4	80
Altre Salmonelle	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
<b>TOTALE SALMONELLE</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>160</b>	<b>124</b>	<b>154</b>	<b>71</b>	<b>132</b>	<b>142</b>	<b>92</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>1.317</b>
<b>TOTALE EPISODI</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>189</b>	<b>167</b>	<b>211</b>	<b>104</b>	<b>168</b>	<b>184</b>	<b>134</b>	<b>173</b>	<b>124</b>	<b>76</b>	<b>73</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>1.917</b>

% S. gruppo D ed Enteritidis sul totale delle Salmonelle	42,9	40,0	84,2	73,1	80,0	76,6	68,2	63,4	68,2	79,6	83,7	84,8	74,3	48,3	43,8	59,5	60,7	15,4	33,3	71,7
Salmonelle non tipizzate %	0,0	30,0	0,0	23,1	5,6	8,9	7,8	12,7	3,0	0,0	8,7	2,3	1,4	3,4	8,3	4,8	0,0	15,4	11,1	5,8



**Tab. 5 - NUMERO DI EPISODI DI MTA E RELATIVO NUMERO DI CASI  
PER SEDE DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO  
Periodo 1988-2005**

	Ristorazione collettiva per gruppi a rischio	%	Ristorazione collettiva per altri gruppi	%	Ristorazione pubblica	%	Rosticceria Stand gastronomici	%	Casa privata	%	Non identificato	%	Totale
<b>N. EPISODI</b>	<b>42</b>	<b>2,2</b>	<b>47</b>	<b>2,5</b>	<b>420</b>	<b>21,9</b>	<b>56</b>	<b>2,9</b>	<b>1.313</b>	<b>68,5</b>	<b>39</b>	<b>2,0</b>	<b>1.917</b>
<b>N. CASI</b>	<b>3.136</b>	<b>19,5</b>	<b>1.373</b>	<b>8,6</b>	<b>5.720</b>	<b>35,6</b>	<b>442</b>	<b>2,8</b>	<b>5.157</b>	<b>32,1</b>	<b>222</b>	<b>1,4</b>	<b>16.050</b>
<b>N. CASI / EPISODIO</b>	<b>74,7</b>		<b>29,2</b>		<b>13,6</b>		<b>7,9</b>		<b>3,9</b>		<b>5,7</b>		<b>8,4</b>

**Tab. 5a - NUMERO DI EPISODI DI MTA PER ANNO E PER SEDE DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO  
Periodo 1988-2005**

ANNI	Ristorazione collettiva per gruppi a rischio	%	Ristorazione collettiva per altri gruppi	%	Ristorazione pubblica	%	Rosticceria Stand gastronomici	%	Casa privata	%	Non identificato	%	Totale
1988	0	0,0	3	18,8	3	18,8	0	0,0	9	56,3	1	6,3	16
1989	0	0,0	2	9,5	6	28,6	0	0,0	13	61,9	0	0,0	21
1990	1	3,2	1	3,2	14	45,2	0	0,0	15	48,4	0	0,0	31
1991	2	4,8	1	2,4	18	42,9	3	7,1	18	42,9	0	0,0	42
1992	1	0,5	4	2,1	35	18,5	9	4,8	136	72,0	4	2,1	189
1993	7	4,2	4	2,4	25	15,0	6	3,6	120	71,9	5	3,0	167
1994	8	3,8	8	3,8	41	19,4	4	1,9	149	70,6	1	0,5	211
1995	3	2,9	2	1,9	26	25,0	0	0,0	70	67,3	3	2,9	104
1996	4	2,4	2	1,2	30	17,9	8	4,8	121	72,0	3	1,8	168
1997	2	1,1	11	6,0	60	32,6	3	1,6	107	58,2	1	0,5	184
1998	3	2,2	2	1,5	27	20,1	4	3,0	93	69,4	5	3,7	134
1999	4	2,3	3	1,7	30	17,3	0	0,0	133	76,9	3	1,7	173
2000	2	1,6	1	0,8	26	21,0	5	4,0	89	71,8	1	0,8	124
2001	2	2,6	1	1,3	17	22,4	3	3,9	53	69,7	0	0,0	76
2002	0	0,0	1	1,4	7	9,6	0	0,0	64	87,7	1	1,4	73
2003	0	0,0	0	0,0	13	20,3	4	6,3	47	73,4	0	0,0	64
2004	0	0,0	0	0,0	19	31,7	3	5,0	38	63,3	0	0,0	60
2005	2	7,1	0	0,0	9	32,1	1	3,6	11	39,3	5	17,9	28
2006	1	1,9	1	1,9	14	26,9	3	5,8	27	51,9	6	11,5	52
	<b>42</b>	<b>2,2</b>	<b>47</b>	<b>2,5</b>	<b>420</b>	<b>21,9</b>	<b>56</b>	<b>2,9</b>	<b>1.313</b>	<b>68,5</b>	<b>39</b>	<b>2,0</b>	<b>1.917</b>

**Tab. 5b - NUMERO DI CASI DI MTA PER ANNO E PER SEDE DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO  
Periodo 1988-2005**

ANNI	Ristorazione collettiva per gruppi a rischio	%	Ristorazione collettiva per altri gruppi	%	Ristorazione pubblica	%	Rosticceria Stand gastronomici	%	Casa privata	%	Non identificato	%	Totale
1988	0	0,0	146	48,5	90	29,9	0	0,0	50	16,6	15	5,0	301
1989	0	0,0	67	30,9	107	49,3	0	0,0	43	19,8	0	0,0	217
1990	10	3,8	41	15,6	123	46,9	0	0,0	88	33,6	0	0,0	262
1991	144	26,1	17	3,1	278	50,5	26	4,7	86	15,6	0	0,0	551
1992	5	0,4	62	5,4	440	38,1	50	4,3	584	50,6	13	1,1	1.154
1993	114	7,9	423	29,5	357	24,9	41	2,9	478	33,3	21	1,5	1.434
1994	2.304	65,4	106	3,0	555	15,7	24	0,7	534	15,1	2	0,1	3.525
1995	182	22,5	36	4,4	339	41,9	0	0,0	243	30,0	10	1,2	810
1996	147	11,0	26	2,0	587	44,1	26	2,0	521	39,1	25	1,9	1.332
1997	33	2,4	328	23,8	640	46,4	13	0,9	362	26,3	3	0,2	1.379
1998	97	9,4	42	4,1	504	48,6	32	3,1	347	33,5	15	1,4	1.037
1999	26	2,6	21	2,1	285	28,6	0	0,0	644	64,7	20	2,0	996
2000	24	3,5	21	3,1	273	40,0	20	2,9	343	50,3	1	0,1	682
2001	30	5,8	14	2,7	200	38,7	99	19,1	174	33,7	0	0,0	517
2002	0	0,0	2	0,6	120	35,7	0	0,0	211	62,8	3	0,9	336
2003	0	0,0	0	0,0	173	49,7	18	5,2	157	45,1	0	0,0	348
2004	0	0,0	0	0,0	286	57,7	50	10,1	160	32,3	0	0,0	496
2005	18	7,4	0	0,0	175	71,7	3	1,2	42	17,2	6	2,5	244
2006	2	0,5	21	4,9	188	43,8	40	9,3	90	21,0	88	20,5	429
	<b>3.136</b>	<b>19,5</b>	<b>1.373</b>	<b>8,6</b>	<b>5.720</b>	<b>35,6</b>	<b>442</b>	<b>2,8</b>	<b>5.157</b>	<b>32,1</b>	<b>222</b>	<b>1,4</b>	<b>16.050</b>

**Ristorazione collettiva per gruppi a rischio:**

Cucina centralizzata  
Case protette per anziani/centri diurni  
Ospedali  
Mense scolastiche (nidi e materne)

**Ristorazione collettiva per altri gruppi:**

Mense aziendali  
Mense universitarie  
Altre mense scolastiche/Caserme


**Ristorazione pubblica:**

Ristoranti/Alberghi/Bar  
Gelaterie  
Pasticcerie


**Rosticceria/Stand gastronomici:**

Rosticcerie  
Stands gastronomici  
Altre mense

**Graf. 6 - DISTRIBUZIONE % DEGLI EPISODI DI MTA PER SEDE DI PREPARAZIONE**  
**Periodo 1988-2006**



**Graf. 7 - EPISODI DI MTA PER TRIENNIO E PER SEDE DI PREPARAZIONE**  
**Periodo 1988-2006**



**Tab. 6 - NUMERO DI EPISODI DI MTA DA SALMONELLA E RELATIVO NUMERO DI CASI  
PER SEDE DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO  
Periodo 1988-2006**

	Ristorazione collettiva per gruppi a rischio	%	Ristorazione collettiva per altri gruppi	%	Ristorazione pubblica	%	Rosticceria Stand gastronomici	%	Casa privata	%	Non identificato	%	Totale
<b>N. EPISODI</b>	<b>27</b>	<b>2,1</b>	<b>23</b>	<b>1,7</b>	<b>226</b>	<b>17,2</b>	<b>37</b>	<b>2,8</b>	<b>981</b>	<b>74,5</b>	<b>23</b>	<b>1,7</b>	<b>1.317</b>
<b>N. CASI</b>	<b>2.808</b>	<b>26,5</b>	<b>560</b>	<b>5,3</b>	<b>2.872</b>	<b>27,1</b>	<b>234</b>	<b>2,2</b>	<b>3.984</b>	<b>37,6</b>	<b>143</b>	<b>1,3</b>	<b>10.601</b>
<b>N. CASI / EPISODIO</b>	<b>104,0</b>		<b>24,3</b>		<b>12,7</b>		<b>6,3</b>		<b>4,1</b>		<b>6,2</b>		<b>8,0</b>

**Tab. 6a - NUMERO DI EPISODI DI MTA DA SALMONELLA PER ANNO E PER SEDE DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO  
Periodo 1988-2006**

ANNI	Ristorazione collettiva per gruppi a rischio	%	Ristorazione collettiva per altri gruppi	%	Ristorazione pubblica	%	Rosticceria Stand gastronomici	%	Casa privata	%	Non identificato	%	Totale
1988	0	0,0	2	28,6	1	14,3	0	0,0	4	57,1	0	0,0	7
1989	0	0,0	1	10,0	5	50,0	0	0,0	4	40,0	0	0,0	10
1990	0	0,0	0	0,0	7	36,8	0	0,0	12	63,2	0	0,0	19
1991	1	3,8	0	0,0	11	42,3	1	3,8	13	50,0	0	0,0	26
1992	1	0,6	3	1,9	26	16,3	6	3,8	120	75,0	4	2,5	160
1993	6	4,8	1	0,8	15	12,1	4	3,2	94	75,8	4	3,2	124
1994	4	2,6	4	2,6	31	20,1	3	1,9	111	72,1	1	0,6	154
1995	2	2,8	0	0,0	12	16,9	0	0,0	56	78,9	1	1,4	71
1996	3	2,3	1	0,8	18	13,6	8	6,1	101	76,5	1	0,8	132
1997	0	0,0	7	4,9	42	29,6	2	1,4	90	63,4	1	0,7	142
1998	3	3,3	2	2,2	12	13,0	2	2,2	69	75,0	4	4,3	92
1999	2	1,5	1	0,8	19	14,4	0	0,0	109	82,6	1	0,8	132
2000	1	1,4	0	0,0	7	10,0	5	7,1	57	81,4	0	0,0	70
2001	1	3,4	0	0,0	0	0,0	2	6,9	26	89,7	0	0,0	29
2002	0	0,0	1	2,1	4	8,3	0	0,0	42	87,5	1	2,1	48
2003	0	0,0	0	0,0	7	16,7	2	4,8	33	78,6	0	0,0	42
2004	0	0,0	0	0,0	2	7,1	1	3,6	25	89,3	0	0,0	28
2005	2	15,4	0	0,0	3	23,1	0	0,0	5	38,5	3	23,1	13
2006	1	5,6	0	0,0	4	22,2	1	5,6	10	55,6	2	11,1	18
	<b>27</b>	<b>2,1</b>	<b>23</b>	<b>1,7</b>	<b>226</b>	<b>17,2</b>	<b>37</b>	<b>2,8</b>	<b>981</b>	<b>74,5</b>	<b>23</b>	<b>1,7</b>	<b>1.317</b>

**Tab. 6b - NUMERO DI CASI DI MTA DA SALMONELLA PER ANNO E PER SEDE DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO  
Periodo 1988-2006**

ANNI	Ristorazione collettiva per gruppi a rischio	%	Ristorazione collettiva per altri gruppi	%	Ristorazione pubblica	%	Rosticceria Stand gastronomici	%	Casa privata	%	Non identificato	%	Totale
1988	0	0,0	137	75,7	20	11,0	0	0,0	24	13,3	0	0,0	181
1989	0	0,0	29	20,6	97	68,8	0	0,0	15	10,6	0	0,0	141
1990	0	0,0	0	0,0	49	38,3	0	0,0	79	61,7	0	0,0	128
1991	92	23,4	0	0,0	223	56,6	9	2,3	70	17,8	0	0,0	394
1992	5	0,5	50	5,2	323	33,6	40	4,2	529	55,1	13	1,4	960
1993	84	10,2	65	7,9	251	30,4	37	4,5	370	44,8	19	2,3	826
1994	2.249	72,8	34	1,1	392	12,7	9	0,3	403	13,0	2	0,1	3.089
1995	89	21,8	0	0,0	115	28,1	0	0,0	203	49,6	2	0,5	409
1996	140	14,1	5	0,5	367	36,9	26	2,6	455	45,7	2	0,2	995
1997	0	0,0	192	21,1	395	43,4	10	1,1	310	34,1	3	0,3	910
1998	97	15,1	42	6,5	205	31,9	23	3,6	263	41,0	12	1,9	642
1999	20	2,8	4	0,6	143	20,4	0	0,0	527	75,1	8	1,1	702
2000	3	1,0	0	0,0	70	22,8	20	6,5	214	69,7	0	0,0	307
2001	9	6,6	0	0,0	0	0,0	44	32,4	83	61,0	0	0,0	136
2002	0	0,0	2	1,1	42	22,5	0	0,0	140	74,9	3	1,6	187
2003	0	0,0	0	0,0	65	33,3	11	5,6	119	61,0	0	0,0	195
2004	0	0,0	0	0,0	34	23,8	2	1,4	107	74,8	0	0,0	143
2005	18	20,9	0	0,0	34	39,5	0	0,0	32	37,2	2	2,3	86
2006	2	1,2	0	0,0	47	27,6	3	1,8	41	24,1	77	45,3	170
	<b>2.808</b>	<b>26,5</b>	<b>560</b>	<b>5,3</b>	<b>2.872</b>	<b>27,1</b>	<b>234</b>	<b>2,2</b>	<b>3.984</b>	<b>37,6</b>	<b>143</b>	<b>1,3</b>	<b>10.601</b>

**Ristorazione collettiva per gruppi a rischio:**

Cucina centralizzata  
Case protette per anziani/centri diurni  
Ospedali  
Mense scolastiche (nidi e materne)

**Ristorazione collettiva per altri gruppi:**

Mense aziendali  
Mense universitarie  
Altre mense scolastiche/Caserme


**Ristorazione pubblica:**

Ristoranti/Alberghi/Bar  
Gelaterie  
Pasticcerie


**Rosticceria/Stand gastronomici:**

Rosticcerie  
Stands gastronomici  
Altre mense

**Graf. 8 - DISTRIBUZIONE % DEGLI EPISODI DI MTA DA SALMONELLA PER SEDE DI PREPARAZIONE  
Periodo 1988-2006**



**Graf. 9 - EPISODI DI MTA DA SALMONELLA PER TRIENNIO  
E PER SEDE DI PREPARAZIONE  
Periodo 1988-2006**




**Tab. 7 - EPISODI DI MTA PER VEICOLO INDIVIDUATO**  
Periodo 1988-2006

VEICOLO		Alimenti contenenti uova	Prodotti carnei	Funghi	Pesce	Non identificato	Altro*	TOTALE	% episodi causati da alimenti contenenti uova sul totale degli episodi
1988	Salm.	4	1	0	1	1	0	7	57,1%
	Altre	2	2	1	2	1	1	9	22,2%
	Tot.	6	3	1	3	2	1	16	37,5%
1989	Salm.	7	0	0	1	1	1	10	70,0%
	Altre	0	1	6	0	3	1	11	0,0%
	Tot.	7	1	6	1	4	2	21	33,3%
1990	Salm.	11	4	0	0	4	0	19	57,9%
	Altre	2	2	1	0	6	1	12	16,7%
	Tot.	13	6	1	0	10	1	31	41,9%
1991	Salm.	17	2	0	0	7	0	26	65,4%
	Altre	4	4	2	0	4	2	16	25,0%
	Tot.	21	6	2	0	11	2	42	50,0%
1992	Salm.	134	5	0	3	16	2	160	83,8%
	Altre	6	4	9	5	4	1	29	20,7%
	Tot.	140	9	9	8	20	3	189	74,1%
1993	Salm.	92	5	0	1	26	0	124	74,2%
	Altre	10	4	9	10	8	2	43	23,3%
	Tot.	102	9	9	11	34	2	167	61,1%
1994	Salm.	99	16	0	3	33	3	154	64,3%
	Altre	6	9	12	8	12	10	57	10,5%
	Tot.	105	25	12	11	45	13	211	49,8%
1995	Salm.	53	3	0	2	13	0	71	74,6%
	Altre	2	7	7	3	12	2	33	6,1%
	Tot.	55	10	7	5	25	2	104	52,9%
1996	Salm.	88	14	0	2	11	17	132	66,7%
	Altre	4	6	12	4	5	5	36	11,1%
	Tot.	92	20	12	6	16	22	168	54,8%
1997	Salm.	100	10	0	0	28	4	142	70,4%
	Altre	9	3	1	4	16	9	42	21,4%
	Tot.	109	13	1	4	44	13	184	59,2%
1998	Salm.	74	4	0	4	10	0	92	80,4%
	Altre	5	5	11	6	11	4	42	11,9%
	Tot.	79	9	11	10	21	4	134	59,0%
1999	Salm.	92	7	0	1	23	9	132	69,7%
	Altre	0	4	4	8	13	12	41	0,0%
	Tot.	92	11	4	9	36	21	173	53,2%
2000	Salm.	41	4	0	2	17	6	70	58,6%
	Altre	2	4	15	19	9	5	54	3,7%
	Tot.	43	8	15	21	26	11	124	34,7%
2001	Salm.	17	6	0	0	6	0	29	58,6%
	Altre	1	6	10	10	14	6	47	2,1%
	Tot.	18	12	10	10	20	6	76	23,7%
2002	Salm.	29	7	0	1	10	1	48	60,4%
	Altre	2	1	7	8	4	3	25	8,0%
	Tot.	31	8	7	9	14	4	73	42,5%
2003	Salm.	28	5	0	0	6	3	42	66,7%
	Altre	2	1	4	3	9	3	22	9,1%
	Tot.	30	6	4	3	15	6	64	46,9%
2004	Salm.	22	1	0	2	2	1	28	78,6%
	Altre	1	5	5	13	6	2	32	3,1%
	Tot.	23	6	5	15	8	3	60	38,3%
2005	Salm.	4	2	0	0	7	0	13	30,8%
	Altre	0	5	0	2	4	4	15	0,0%
	Tot.	4	7	0	2	11	4	28	14,3%
2006	Salm.	9	4	2	2	2	1	18	50,0%
	Altre	2	5	2	10	6	8	33	6,1%
	Tot.	11	9	2	12	8	9	51	21,6%
TOTALE	Salm.	921	100	0	25	223	48	1317	69,9%
	Altre	60	78	118	115	147	81	599	10,0%
	Tot.	981	178	118	140	370	129	1916	51,2%

\* In "Altro" sono compresi gli episodi con i seguenti veicoli: peperoni, formaggio ed altro.

**Graf. 10 - DISTRIBUZIONE % DEGLI EPISODI DI MTA E DA SALMONELLA PER VEICOLO**  
Periodo 1988-2006




Tab. 8 - EPISODI DI MTA DA SALMONELLA CON VEICOLO INDIVIDUATO "ALIMENTI CONTENENTI UOVA" PER SEDE DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO  
Periodo 1988-2006

Sede di preparazione	Triennio						Totale
	1988-90	1991-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-06	
Ristorazione collettiva per gruppi a rischio	0	2	5	1	0	0	8
Ristorazione collettiva per altri gruppi	2	2	1	7	0	0	12
Ristorazione pubblica	7	44	42	52	4	11	160
Rosticceria - Stand gastronomici	0	11	6	3	4	1	25
Casa privata	13	182	186	199	79	50	709
Non identificato	0	2	0	4	0	1	7
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>243</b>	<b>240</b>	<b>266</b>	<b>87</b>	<b>63</b>	<b>921</b>


Tab. 9 - CASI DI MTA DA SALMONELLA CON VEICOLO INDIVIDUATO "ALIMENTI CONTENENTI UOVA" PER SEDE DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO  
Periodo 1988-2006

Sede di preparazione	Triennio						Totale
	1988-90	1991-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-06	
Ristorazione collettiva per gruppi a rischio	0	36	2288	5	0	0	2329
Ristorazione collettiva per altri gruppi	36	89	7	131	0	0	263
Ristorazione pubblica	93	729	658	509	27	130	2146
Rosticceria - Stand gastronomici	0	86	23	30	31	2	172
Casa privata	82	817	756	818	307	216	2996
Non identificato	0	13	0	12	0	2	27
<b>Totale</b>	<b>211</b>	<b>1770</b>	<b>3732</b>	<b>1505</b>	<b>365</b>	<b>350</b>	<b>7933</b>

**Graf 12 - EPISODI DI MTA DA SALMONELLA CON VEICOLO INDIVIDUATO "ALIMENTI CONTENENTI UOVA" PER  
 AMBITO DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO**  
 Periodo 1988-2006



**Graf 13 - CASI DI MTA DA SALMONELLA CON VEICOLO INDIVIDUATO "ALIMENTI CONTENENTI UOVA" PER  
 AMBITO DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO**  
 Periodo 1988-2006



Tab. 10 - FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI NEGLI EPISODI DI MTA PER AMBITO DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO\*  
Periodo 1988-2006

FATTORI DI RISCHIO	Case private		Rist. pubblica/collettiva**		Totale°	
	n. episodi	%	n. episodi	%	n. episodi	%
Scorretto mantenimento temperatura	236	15,9%	153	23,5%	394	18,2%
Cottura inadeguata	305	20,5%	82	12,6%	391	18,1%
Contaminazione dell'attrezzatura	68	4,6%	52	8,0%	120	5,5%
Cibo ottenuto da fonti incerte	256	17,2%	49	7,5%	310	14,3%
Cattiva igiene dell'alimentarista	65	4,4%	80	12,3%	145	6,7%
Contaminazione di cibi cotti con cibi crudi	54	3,6%	47	7,2%	103	4,8%
Più giorni tra preparazione e consumo	85	5,7%	50	7,7%	137	6,3%
Alimentarista colonizzato	3	0,2%	14	2,2%	17	0,8%
Scorretta preparazione	7	0,5%	7	1,1%	14	0,6%
Cibo crudo	294	19,8%	72	11,1%	372	17,2%
Altro	115	7,7%	45	6,9%	162	7,5%
<b>TOTALE</b>	<b>1488</b>	<b>100,0%</b>	<b>651</b>	<b>100,0%</b>	<b>2165</b>	<b>100,0%</b>


\*In quanto è possibile individuare più fattori di rischio per ciascun episodio, la numerosità totale in questa tabella può essere superiore al numero totale di episodi osservati

\*\* L'ambito della ristorazione pubblica/collettiva comprende: rist. collettiva per gruppi a rischio, rist. collettiva per altri gruppi, rist. pubblica, rosticcerie e stand gastronomici.


° Nel totale sono compresi anche gli episodi in cui l'ambito non è individuato

<b>Ristorazione collettiva per gruppi a rischio:</b>	<b>Ristorazione collettiva per altri gruppi:</b>	<b>Ristorazione pubblica:</b>	<b>Rosticceria/</b>
Cucina centralizzata	Mense aziendali	Ristoranti/Alberghi/Bar	<b>Stand gastronomici:</b>
Case protette per anziani/centri diurni	Mense universitarie	Gelaterie	Rosticcerie
Ospedali	Altre mense scolastiche/Caserme	Pasticcerie	Stand gastronomici
Mense scolastiche (nidi e materne)			Altre mense

**Graf. 14 - DISTRIBUZIONE % DEI FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI NEGLI EPISODI DI MTA PER AMBITO DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO**  
Periodo 1988-2006



**Graf. 15 - DISTRIBUZIONE % DEGLI EPISODI DI MTA E DA SALMONELLA PER FATTORE DI RISCHIO**  
 Perido 1988-2006



Tab. 11 - FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI NEGLI EPISODI DI MTA PER SEDE DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO\*  
Periodo 1988-2005

FATTORI DI RISCHIO	Rist. collettiva per gruppi a rischio	%	Rist. collettiva per altri gruppi	%	Rist. pubblica	%	Rosticc. Stand gastr.	%	Casa privata	%	Non identif.	%	Totale	%
Scorretto mantenimento temperatura	12	25,0	16	26,7	104	22,4	21	26,6	236	15,9	5	19,2	394	18,2
Cottura inadeguata	5	10,4	10	16,7	52	11,2	15	19,0	305	20,5	4	15,4	391	18,1
Contaminazione dell'attrezzatura	7	14,6	5	8,3	32	6,9	8	10,1	68	4,6	0	0,0	120	5,5
Cibo ottenuto da fonti incerte	4	8,3	2	3,3	42	9,1	1	1,3	256	17,2	5	19,2	310	14,3
Cattiva igiene dell'alimentarista	5	10,4	4	6,7	61	13,1	10	12,7	65	4,4	0	0,0	145	6,7
Contaminazione di cibi cotti con cibi crudi	4	8,3	4	6,7	32	6,9	7	8,9	54	3,6	2	7,7	103	4,8
Più giorni tra preparazione e consumo	4	8,3	7	11,7	34	7,3	5	6,3	85	5,7	2	7,7	137	6,3
Alimentarista colonizzato	0	0,0	1	1,7	11	2,4	2	2,5	3	0,2	0	0,0	17	0,8
Scorretta preparazione	1	2,1	1	1,7	4	0,9	1	1,3	7	0,5	0	0,0	14	0,6
Cibo crudo	3	6,3	6	10,0	57	12,3	6	7,6	294	19,8	6	23,1	372	17,2
Altro	3	6,3	4	6,7	35	7,5	3	3,8	115	7,7	2	7,7	162	7,5
<b>TOTALE</b>	<b>48</b>	<b>100,0</b>	<b>60</b>	<b>100,0</b>	<b>464</b>	<b>100,0</b>	<b>79</b>	<b>100,0</b>	<b>1.488</b>	<b>100,0</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>2.165</b>	<b>100,0</b>

Tab. 12 - FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI NEGLI EPISODI DI MTA DA SALMONELLA PER SEDE DI PREPARAZIONE DELL'ALIMENTO\*  
Periodo 1988-2005

FATTORI DI RISCHIO	Rist. collettiva per gruppi a rischio	%	Rist. collettiva per altri gruppi	%	Rist. pubblica	%	Rosticc. Stand gastr.	%	Casa privata	%	Non identif.	%	Totale	%
Scorretto mantenimento temperatura	5	16,1	4	14,3	54	19,5	12	20,7	188	15,8	3	17,6	266	16,6
Cottura inadeguata	4	12,9	5	17,9	29	10,5	12	20,7	248	20,9	3	17,6	301	18,8
Contaminazione dell'attrezzatura	5	16,1	3	10,7	17	6,1	7	12,1	57	4,8	0	0,0	89	5,6
Cibo ottenuto da fonti incerte	3	9,7	2	7,1	30	10,8	0	0,0	186	15,7	3	17,6	224	14,0
Cattiva igiene dell'alimentarista	4	12,9	2	7,1	43	15,5	8	13,8	55	4,6	0	0,0	112	7,0
Contaminazione di cibi cotti con cibi crudi	3	9,7	2	7,1	17	6,1	6	10,3	45	3,8	1	5,9	74	4,6
Più giorni tra preparazione e consumo	1	3,2	3	10,7	26	9,4	4	6,9	72	6,1	2	11,8	108	6,8
Alimentarista colonizzato	0	0,0	1	3,6	8	2,9	1	1,7	1	0,1	0	0,0	11	0,7
Scorretta preparazione	1	3,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	2	0,1
Cibo crudo	3	9,7	5	17,9	40	14,4	5	8,6	273	23,0	3	17,6	329	20,6
Altro	2	6,5	1	3,6	13	4,7	3	5,2	61	5,1	2	11,8	82	5,1
<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>100,0</b>	<b>28</b>	<b>100,0</b>	<b>277</b>	<b>100,0</b>	<b>58</b>	<b>100,0</b>	<b>1.187</b>	<b>100,0</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>	<b>1.598</b>	<b>100,0</b>

Ristorazione collettiva per gruppi a rischio:

Cucina centralizzata  
Case protette per anziani/centri diurni  
Ospedali  
Mense scolastiche (nidi e materne)

Ristorazione collettiva per altri gruppi:

Mense aziendali  
Mense universitarie  
Altre mense scolastiche/Casermes

Ristorazione pubblica:

Ristoranti/Aberghi/Bar  
Gelaterie  
Pasticcerie

Rosticceria/Stand gastro

Rosticcerie  
Stands gastronomici  
Altre mense

\*In quinato è possibile individuare più fattori di rischio per ciascun episodio, la numerosità totale in questa tabella può essere superiore al numero totale di episodi osservati