


1° Giornata di studio sul programma di screening per la prevenzione dei tumori del colon-retto

Bologna, 10 - 03 - 2005

**Aula Magna
Regione Emilia-Romagna**

SCREENING DEL CARCINOMA COLORETTALE

ESPERIENZE ITALIANE



Tumore del colon-retto (ICD-IX 153-154)

Prevalenza RER - Stime al 2000

Maschi n. 11.300

Femmine n. 10.000

Totale n. 21.300

Sopravvivenza RER a 5 anni dalla diagnosi

(maschi + femmine)

Tumore del colon 50%

Tumore del retto 46%

Popolazione 50-69 anni residente in RER all'1/2004

	50-69 anni		
	Femmine residenti	Maschi residenti	Totale residenti
Azienda USL di Piacenza	35.425	34.182	69.607
Azienda USL di Parma	52.245	49.464	101.709
Azienda USL di Reggio Emilia	56.369	54.353	110.722
Azienda USL di Modena	81.313	76.999	158.312
Azienda USL di Bologna	111.084	101.333	212.417
Azienda USL di Imola	15.514	14.974	30.488
Azienda USL di Ferrara	50.268	46.240	96.508
Azienda USL di Ravenna	48.521	44.821	93.342
Azienda USL di Forlì	23.270	21.804	45.074
Azienda USL di Cesena	24.196	23.096	47.292
Azienda USL di Rimini	35.945	33.370	69.315
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	534.150	500.636	1.034.786

STRATEGIE DI DIAGNOSI PRECOCE INDICATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- **SCREENING DI POPOLAZIONE:** età 50-69 anni
 - FOBT immunologico (aggreg. su lattice; cut-off 100 ngI/m) biennale con prelievo unico
 - colonscopia nei FOBT positivi
- **Offerta attiva di colonscopia (in alternativa di FOBT)** a persone che abbiano avuto un familiare di primo grado, o 2 familiari di secondo grado colpiti da ca. colo-rettale, insorto in età \leq a 69 anni
- **Sensibilizzazione delle persone di 70-74 anni che non hanno mai eseguito indagini sul colon o le hanno eseguite da più di 10 anni a sottoporsi ad una colonscopia una volta nella vita.**
Questo compito è affidato prevalentemente ai MMG.



Centri di distribuzione test

Centri lettura I livello: laboratorio

Centri di raccolta test

Centro screening:
gestione anagrafe e inviti;
questionari; spedizioni risposte;
organizzazione richiami; raccolta dati

Centri di II livello: colonscopia

Centri di lettura: istologici

Centri di II livello: clisma opaco

Centri di III livello: chirurgia

Residenti 50-69 anni elenco assistiti AUSL

Incrociati con SDO, ASA, Anatomia Patologica, RT, ASA, Endoscopia digestiva, per "pulizia liste"

Invito postale + questionario anamnestico esami precedenti

Consegna test (FOBT) previa verifica risposte al questionario: Centro screening, Sedi distribuzione diretta farmaci, Farmacie, Sedi distrettuali, Ambulatori MMG, Consegna a domicilio

Riconsegna del campione prelevato (entro 3gg dal prelievo)
Farmacie, Sedi distrettuali, Centro Screening, ecc.

Dati anamnestici precedenti esami

Laboratorio analisi test immunologico

aggregazione su lattice con cut off a 100 ng/ml
processazione entro 5 giorni dalla riconsegna

Ripetizione FOBT

Negativo

Inidoneo

Positivo

(entro 15gg)

risposta postale
con consiglio di
ripetizione biennale

richiamo telefonico per
proposta di
approfondimento diagnostico
endoscopico

COLONSCOPIA

(o clisma opaco a doppio contrasto in caso di
non praticabilità o incompletezza)

entro 30 giorni

COLONSCOPIA

(o clisma opaco a doppio contrasto in caso di non praticabilità o incompletezza)

Negativa



Ripetizione FOBT
dopo 5 anni

Neoformazione



Eventuale terapia
endoscopica e/o
chirurgica



Follow up

Stima Scenario

Popolazione totale	4.059.416
Popolazione 50-69	1.033.768
Popolazione inevitabile	909.716
Popolazione aderente (50%)	454.858
Stima FOBT + (4,7%)	21.378

Data di avvio indicata

(spedizione prime lettere)

21 Marzo 2005