

La nascita in Emilia-Romagna nel 2023

Bologna, 27.11.2024



Gravidanza e parto

Enrica Perrone




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

di cosa parleremo

- scelta assistenziale in gravidanza e parto
- conduzione in autonomia ostetrica
- interventi medici in travaglio e parto
- taglio cesareo
- vaccini in gravidanza

come eravamo: 2013




n= 37.323



n= 32

come siamo: 2023




n= 28.709



n= 19

PN per classi di volume di parti in E-R



Ministero della Salute

DM 70/2015




REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1112 del 24/07/2017


PN per classi di volume di parti in Italia




servizio assistenziale scelto al parto



shutterstock.com · 1980529235




servizio pubblico e assistenza in gravidanza




- 56% donne con cittadinanza italiana
- 90% donne con cittadinanza straniera


donne seguite in consultorio e Ausl di residenza



donne in gravidanza utenti dei consultori, 2019



corsi di accompagnamento alla nascita



in 75% dei casi presso
consultorio

decorso della gravidanza



32,5%

decorso fisiologico;
conduzione ostetrica

36,8%

decorso fisiologico;
conduzione medica


30,6%

decorso patologico


Incontro RER e Referenti aziendali Flusso CedAP – 21.06.2023

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/sisepts/sanita/cedap/documentazione/iniziative>


consultorio: gestione in autonomia ostetrica



conduzione del travaglio in autonomia ostetrica





continuità assistenziale in autonomia ostetrica




1 donna su 2 con gravidanza gestita da ostetrica ha travaglio a conduzione ostetrica


induzione travaglio



travaglio e parto senza alcun intervento





travagli indotti o pilotati, episiotomia, farmaci antalgici, parti operativi




travaglio e parto senza alcun intervento


gestione in autonomia
ostetrica




assenza persona di fiducia in travaglio-parto



parto con taglio cesareo




parti con TC primario, 2023



Le principali classi di nullipare


Group 1



Nulliparous with single cephalic pregnancy, ≥ 37 weeks gestation in spontaneous labour




Group 2a



Nulliparous with single cephalic pregnancy, ≥ 37 weeks gestation who either had labour induced



Group 2b




Nulliparous with single cephalic pregnancy, ≥ 37 weeks gestation who were delivered by caesarean section before labour



classi Robson: 2013-2023


tasso di TC

Group 1



Nulliparous with single cephalic pregnancy, ≥ 37 weeks gestation in spontaneous labour

Group 2a




Nulliparous with single cephalic pregnancy, ≥ 37 weeks gestation who either had labour induced

	Hub	Spoke ≥ 1000 p/a	Spoke < 1000 p/a	Totale E-R
Group 1	-5,1%	-4,7%	-4,3%	-5,0%
Group 2a	-11,7%	-8,0%	-6,5%	-10,2%

% di donne


Group 2b



Nulliparous with single cephalic pregnancy, ≥ 37 weeks gestation who were delivered by caesarean section before labour

	Hub	Spoke ≥ 1000 p/a	Spoke < 1000 p/a	Totale E-R
Group 2b	0,3%	0,4%	-1,5%	0,0%

classe V Robson



	Hub	Spoke ≥ 1000 p/a	Spoke < 1000 p/a	Totale E-R
donne (2013-2023)	-0,2%	-0,4%	-2,6%	-0,6%
TC (2013-2023)	-12,0%	-12,6%	-3,7%	-12,1%

vaccinazioni raccomandate in gravidanza

vaccinazione
anti-influenzale


13,8%




vaccinazione
anti-pertosse

61,3%

vaccinazione anti-influenzale



vaccinazione anti-pertosse



sensibilizzare alla vaccinazione

SaPeRiDoc

Centro di Documentazione sulla Salute Perinatale e Riproduttiva



AGGIORNAMENTI

Influenza in gravidanza

Diagnosi, rischi per la mamma e per il feto, terapia e vaccinazione. La sezione dedicata all'influenza durante la gravidanza si aggiorna rispetto alle prove di efficacia più recenti.

riflessioni conclusive

- ✓ 60% delle donne è seguita in gravidanza dal consultorio familiare
- ✓ quasi il 40% delle donne partecipa a corsi di accompagnamento alla nascita
- ✓ negli ultimi 10 anni il ricorso a taglio cesareo si è ridotto in particolare nelle nullipare (classe I e IIa) e nelle pre-cesarizzate

riflessioni conclusive

- ✓ per monitorare il modello assistenziale a gestione ostetrica è necessario migliorare l'accuratezza delle informazioni sulla conduzione di gravidanza
- ✓ implementare la gestione in autonomia ostetrica nei travagli-parti con decorso fisiologico
- ✓ incrementare adesione alle vaccinazioni in gravidanza