

Formazione itinerante
CedAP e Sistema Informativo perinatale

Il secondo Rapporto nascita della
Regione Emilia Romagna anno 2004

La provincia di Bologna

copertura della rilevazione

| | Nati SDO | Arrivati CedAP | % copertura | % di correttezza | % di completezza |
|---------------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Porretta Terme | 137 | 133 | 97% | 96% | 93,4% |
| Bentivoglio | 1.043 | 1.042 | 100% | 100% | 99,9% |
| Maggiore - Bologna | 2.792 | 2.784 | 100% | 98% | 97,3% |
| Villa Erbosa | 114 | 113 | 99% | 25% | 24,6% |
| Villa Regina | 0 | 36 | 100% | 0% | |
| Imola | 1.098 | 1.098 | 100% | 100% | 100,0% |
| S.Orsola-Malpighi-Bologna | 3.653 | 3.449 | 94% | 94% | 88,3% |

Valori regionali:

- ✱ percentuale di copertura: 97.7%
 - ✱ percentuale di correttezza: 97.5%
 - ✱ percentuale di completezza: 95.5%
-

residenza madre

| Azienda di evento | Luogo di residenza madre | | | | | | Totale | |
|---------------------------|--------------------------|-------|---------------|-----|----------|-----|----------|-----|
| | Emilia Romagna | | Altre regioni | | Estero | | | |
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % |
| Porretta Terme | 118 | 92,2 | 9 | 7,0 | 1 | 0,8 | 128 | 100 |
| Bentivoglio | 1.018 | 98,0 | 21 | 2,0 | . | . | 1.039 | 100 |
| Maggiore - Bologna | 2.544 | 93,5 | 94 | 3,5 | 84 | 3,1 | 2.722 | 100 |
| Villa Erbosa | 28 | 100,0 | . | . | . | . | 28 | 100 |
| Imola | 1.049 | 96,6 | 25 | 2,3 | 12 | 1,1 | 1.086 | 100 |
| S.Orsola-Malpighi-Bologna | 2.846 | 89,8 | 177 | 5,6 | 146 | 4,6 | 3.169 | 100 |

Valori regionali:

- ✱ Regione Emilia Romagna: 93.3%
- ✱ Altre Regioni: 4.5%
- ✱ Estero: 2.2%

N.B.: l'analisi è per residenza e non per domicilio

scolarità materna

| Azienda di evento | Titolo di studio madre | | | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------|------|--------------|-----|-----------------|------|-----------------|------|---------------------|-----|----------|-----|
| | Laurea | | Laurea Breve | | Media Superiore | | Media Inferiore | | Elementare/ N.T. | | | |
| | Soggetti | % | Soggetti | % | Soggetti | % | Soggetti | % | Soggetti | % | Soggetti | % |
| Porretta Terme | 15 | 11,7 | 3 | 2,3 | 60 | 46,9 | 45 | 35,2 | 5 | 3,9 | 128 | 100 |
| Bentivoglio | 125 | 12,0 | 24 | 2,3 | 511 | 49,2 | 339 | 32,6 | 40 | 3,9 | 1.039 | 100 |
| Maggiore - Bologna | 668 | 24,5 | 13 | 0,5 | 1.289 | 47,4 | 693 | 25,5 | 59 | 2,2 | 2.722 | 100 |
| Villa Erbosa | 13 | 46,4 | 2 | 7,1 | 12 | 42,9 | 1 | 3,6 | . | . | 28 | 100 |
| Imola | 172 | 15,8 | 21 | 1,9 | 550 | 50,6 | 310 | 28,6 | 33 | 3,0 | 1.086 | 100 |
| S.Orsola- Bologna | 912 | 28,8 | 57 | 1,8 | 1.417 | 44,7 | 730 | 23,0 | 53 | 1,7 | 3.169 | 100 |

Valori regionali:

- ✱ laurea / laurea breve: 19.0%
- ✱ diploma scuola media superiore: 47.7%
- ✱ licenza elementare /scuola media inferiore: 33.4%

N.B.: analisi secondo il titolo di studio conseguito

scolarità materna: i rischi associati

| | OR (IC 95%) | OR [^] (IC 95%) |
|--|---------------|--------------------------|
| numero visite < 4 | 2.1 (1.9-2.4) | 1.6 (1.4-1.9) |
| effettuazione I visita \geq 12 settimane | 2.1 (1.9-2.2) | |
| mancata esecuzione ecografia | 2.4 (1.5-3.8) | |
| minor diagnosi prenatale invasiva (>35aa) | 0.8 (0.7-0.9) | |
| maggior frequenza ricovero in gravidanza | 1.4 (1.2-1.5) | 1.4 (1.2-1.5) |
| maggior frequenza parto pretermine | 1.3 (1.1-1.5) | 1.3 (1.2-1.5) |
| maggior frequenza parto cesareo | | 1.2 (1.1-1.3) |
| maggior frequenza basso peso neonato | 1.3 (1.1-1.4) | 1.4 (1.2-1.6) |

Elaborazioni su dati Emilia Romagna 2004

OR[^]: aggiustato per età, scolarità, stato civile e cittadinanza madre

cittadinanza materna

| Azienda di evento | Cittadinanza madre | | | | Totale | |
|--------------------|--------------------|------|-----------|------|----------|-----|
| | Italiana | | Straniera | | | |
| | Soggetti | % | Soggetti | % | Soggetti | % |
| Porretta Terme | 94 | 73,4 | 34 | 26,6 | 128 | 100 |
| Bentivoglio | 889 | 85,6 | 150 | 14,4 | 1.039 | 100 |
| Maggiore - Bologna | 2.209 | 81,2 | 513 | 18,9 | 2.722 | 100 |
| Villa Erbosa | 27 | 96,4 | 1 | 3,6 | 28 | 100 |
| Imola | 896 | 82,5 | 190 | 17,5 | 1.086 | 100 |
| S.Orsola- Bologna | 2.578 | 81,4 | 591 | 18,7 | 3.169 | 100 |

Valori regionali:

- ✱ cittadinanza italiana: 81.2%
- ✱ cittadinanza straniera: 18.8%

N.B.: dati non sovrapponibili al Paese d'origine della madre

cittadinanza straniera: i rischi associati

| | OR (IC 95%) | OR [^] (IC 95%) |
|---|------------------|--------------------------|
| numero visite < 4 | 3.5 (3.2-3.9) | 3.0 (2.7-3.3) |
| effettuazione I visita ≥ 12 settimane | 3.8 (3.5-4.0) | |
| mancata esecuzione ecografia | 2.8 (2.1-3.8) | |
| minor diagnosi prenatale invasiva (>35aa) | 0.16 (0.13-0.19) | |
| maggior frequenza parto pretermine | 1.7 (1.3-2.8) | 1.1 (1.0-1.3) |
| minor frequenza parto cesareo | 0.8 (0.76-0.87) | 0.9 (0.85-0.97) |
| maggior frequenza basso peso neonato | 1.4 (1.1-1.7) | n.s. |

Elaborazioni su dati Emilia Romagna 2004

OR[^]: aggiustato per età, scolarità, stato civile e cittadinanza madre

precedenti concepimenti

| Stabilimento di evento | Concepimenti precedenti | | | | Totale | |
|---------------------------|-------------------------|------|----------|------|----------|-----|
| | SI | | NO | | | |
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % |
| Porretta Terme | 70 | 54,7 | 58 | 45,3 | 128 | 100 |
| Bentivoglio | 550 | 52,9 | 489 | 47,1 | 1.039 | 100 |
| Maggiore - Bologna | 1.447 | 53,2 | 1.275 | 46,8 | 2.722 | 100 |
| Villa Erbosa | 18 | 64,3 | 10 | 35,7 | 28 | 100 |
| Imola | 598 | 55,1 | 488 | 44,9 | 1.086 | 100 |
| S.Orsola-Malpighi-Bologna | 1.781 | 56,2 | 1.388 | 43,8 | 3.169 | 100 |

Valori regionali:

- ✱ primigravide: 45.7%
 - ✱ plurigravide: 54.3%
-

esito precedenti concepimenti

| Stabilimento di evento | Hanno avuto parti precedenti | | Hanno avuto aborti spontanei | | Hanno avuto I.V.G. | | Totale |
|---------------------------|------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------|------|----------|
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti |
| Porretta Terme | 55 | 78,6 | 22 | 31,4 | 13 | 18,6 | 70 |
| Bentivoglio | 475 | 86,4 | 125 | 22,7 | 59 | 10,7 | 550 |
| Maggiore - Bologna | 1.159 | 80,2 | 387 | 26,8 | 197 | 13,6 | 1.446 |
| Villa Erbosa | 14 | 77,8 | 5 | 27,8 | 1 | 5,6 | 18 |
| Imola | 485 | 81,1 | 205 | 34,3 | 59 | 9,9 | 598 |
| S.Orsola-Malpighi-Bologna | 1.334 | 74,9 | 602 | 33,8 | 349 | 19,6 | 1.780 |

Valori regionali:

- ✱ parti: 84.4%
- ✱ aborti spontanei: 27.8%
- ✱ interruzioni volontarie gravidanza: 11.0%

N.B.: Solo madri che hanno avuto almeno un precedente parto o aborto o ivg

servizio utilizzato in gravidanza

| Stabilimento di evento | Servizio utilizzato | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|----------|--------|
| | privato | | consultorio | | ambulatorio | | nessuno | | | |
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % |
| Porretta Terme | 51 | 39,8% | 55 | 43,0% | 22 | 17,2% | 0 | 0,0% | 128 | 100,0% |
| Bentivoglio | 783 | 75,4% | 180 | 17,3% | 75 | 7,2% | 1 | 0,1% | 1039 | 100,0% |
| Maggiore - Bologna | 2117 | 77,8% | 430 | 15,8% | 168 | 6,2% | 7 | 0,3% | 2722 | 100,0% |
| Villa Erbosa | 28 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 28 | 100,0% |
| Imola | 810 | 74,6% | 223 | 20,5% | 49 | 4,5% | 4 | 0,4% | 1086 | 100,0% |
| S. Orsola - Bologna | 2204 | 69,5% | 435 | 13,7% | 398 | 12,6% | 132 | 4,2% | 3169 | 100,0% |

Valori regionali:

- ✱ privato: 67.3%
- ✱ consultorio pubblico: 25.0%
- ✱ ambulatorio ospedaliero (rischio e non): 6.8%

N.B.: servizio utilizzato prevalentemente in gravidanza

ricovero in gravidanza

| Stabilimento di evento | Ricovero in gravidanza | | | | | |
|---------------------------|------------------------|------|----------|------|----------|-----|
| | SI | | NO | | Totale | |
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % |
| Porretta Terme | 3 | 2,3 | 125 | 97,7 | 128 | 100 |
| Bentivoglio | 77 | 7,4 | 962 | 92,6 | 1.039 | 100 |
| Maggiore - Bologna | 237 | 8,7 | 2.485 | 91,3 | 2.722 | 100 |
| Villa Erbosa | 3 | 10,7 | 25 | 89,3 | 28 | 100 |
| Imola | 132 | 12,2 | 952 | 87,8 | 1.084 | 100 |
| S.Orsola-Malpighi-Bologna | 298 | 9,4 | 2.867 | 90,6 | 3.165 | 100 |

Valori regionali:

✱ tasso di ricovero: 9.8%

N.B.: manca causa del ricovero; possibile link con SDO

una classificazione dei punti nascita

✱ gruppo A:

punti nascita con numero di parti compresi tra 150-799

Fiorenzuola, Fidenza, Borgo Val di Taro, Città di Parma, Guastalla, Castelnovo, Mirandola, Sassuolo, Pavullo, Ospedale Delta, Cento

✱ gruppo B:

punti nascita con numero di parti compresi tra 800-1999

Piacenza, Montecchio Emilia, Scandiano, Carpi, Bentivoglio, Imola, Ravenna, Lugo, Faenza, Forlì, Arcispedale S. Anna Ferrara



✱ gruppo C:

punti nascita con numero di parti superiore a 1999

Ospedale Maggiore Bologna, Cesena, Rimini, Ospedali Riuniti Parma, S.Maria Nuova Reggio, Policlinico Modena, S.Orsola Bologna

N.B.: esclusi i punti nascita con < 150 parti /anno

ricovero in gravidanza



N.B.: dati di Cesena non disponibili (inattendibili)

Indagini prenatali invasive (almeno una):

| Stabilimento ≤ 35 anni | Effettuata almeno un'indagine prenatale invasiva | | |
|---------------------------|--|-------------|------------------|
| | Si | valorizzati | % su valorizzati |
| Porretta Terme | 4 | 110 | 3,6 |
| Bentivoglio | 148 | 827 | 17,9 |
| Maggiore - Bologna | 462 | 2.009 | 23,0 |
| Villa Erbosa | 7 | 22 | 31,8 |
| Imola | 293 | 857 | 34,2 |
| S.Orsola-Bologna | 670 | 2.333 | 28,7 |


| > 35 anni | Effettuata almeno un'indagine prenatale invasiva | | |
|--------------------|--|-------------|------|
| | SI | valorizzati | % |
| Porretta Terme | 8 | 18 | 44,4 |
| Bentivoglio | 105 | 211 | 49,8 |
| Maggiore - Bologna | 463 | 713 | 64,9 |
| Villa Erbosa | 3 | 5 | 60,0 |
| Imola | 175 | 228 | 76,8 |
| S.Orsola-Bologna | 573 | 829 | 69,1 |

Valori regionali:


- ✱ Frequenza indagine età ≤ 35 anni: 21.5%
- ✱ Frequenza indagine età >35 anni: 63.5%

Indagini prenatali invasive: età ≤ 35 aa

Gruppo B




Gruppo C




N.B.: dati di Rimini non disponibili

Indagini prenatali invasive: età > 35 aa

Gruppo B



Gruppo C



N.B.: dati di Rimini non disponibili

modalità del travaglio

| Stabilimento di evento | Modalità travaglio | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------|----------|------|----------|-----|----------|-----|
| | spontaneo | | indotto | | senza | | Totale | |
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % |
| Porretta Terme | 127 | 100,0 | . | . | . | . | 127 | 100 |
| Bentivoglio | 695 | 82,1 | 132 | 15,6 | 20 | 2,4 | 847 | 100 |
| Maggiore - Bologna | 1.724 | 79,2 | 451 | 20,7 | 2 | 0,1 | 2.177 | 100 |
| Villa Erbosa | 11 | 44,0 | 14 | 56,0 | . | . | 25 | 100 |
| Imola | 575 | 65,6 | 297 | 33,9 | 5 | 0,6 | 877 | 100 |
| S.Orsola-Malpighi-Bologna | 1.895 | 74,5 | 648 | 25,5 | . | . | 2.543 | 100 |


Valori regionali:

- ✱ parto spontaneo: 76.7%
- ✱ parto indotto: 21.9%


N.B.: esclusi i parti cesarei elettivi

induzione del travaglio

Gruppo B



Gruppo C



N.B.: esclusi i parti cesarei elettivi

tipo di induzione

| Stabilimento di evento | Tipo induzione | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------|------------|------|---------------|-----|------------|------|----------|-----|
| | prostaglandine | | ossitocina | | altro farmaco | | amnioressi | | Totale | |
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % |
| Bentivoglio | 133 | 92,4 | 10 | 6,9 | 1 | 0,7 | . | . | 144 | 100 |
| Maggiore - Bo | 438 | 82,8 | 87 | 16,5 | . | . | 4 | 0,8 | 529 | 100 |
| Villa Erbosa | 10 | 66,7 | 5 | 33,3 | . | . | . | . | 15 | 100 |
| Imola | 183 | 60,0 | 63 | 20,7 | 1 | 0,3 | 58 | 19,0 | 305 | 100 |
| S.Orsola-Bo | 465 | 70,5 | 189 | 28,6 | 2 | 0,3 | 4 | 0,6 | 660 | 100 |

Valori regionali:

- ✱ prostaglandine: 64.1%
 - ✱ ossitocina: 29.1%
-

parto pilotato (augmentation)


| Stabilimento di evento | Parto pilotato | | | | | |
|------------------------|----------------|------|----------|-------|----------|-----|
| | SI | | NO | | Totale | |
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % |
| Porretta Terme | . | | 128 | 100,0 | 128 | 100 |
| Bentivoglio | 14 | 1,4 | 1.025 | 98,7 | 1.039 | 100 |
| Maggiore - Bologna | 442 | 16,2 | 2.280 | 83,8 | 2.722 | 100 |
| Villa Erbosa | 7 | 25,0 | 21 | 75,0 | 28 | 100 |
| Imola | 141 | 13,0 | 945 | 87,0 | 1.086 | 100 |
| S.Orsola -Bologna | 360 | 11,4 | 2.809 | 88,6 | 3.169 | 100 |

Valori regionali:

✱ parto pilotato: 9.6%

necessità di codifica che faciliti la distinzione
tra induzione e augmentation

ora del parto



età gestazionale

| Luogo del parto | Durata della gravidanza in settimane | | | | | | Totale | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|------|-----------|-----|----------|-----|
| | < 37 sett. | | da 37 a 41 sett. | | ≥42 sett. | | | |
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % |
| Porretta Terme | 2 | 1,6 | 124 | 96,9 | 2 | 1,6 | 128 | 100 |
| Bentivoglio | 68 | 6,6 | 946 | 91,1 | 24 | 2,3 | 1.038 | 100 |
| Maggiore - Bologna | 184 | 6,8 | 2.405 | 88,5 | 130 | 4,8 | 2.719 | 100 |
| Villa Erbosa | . | . | 27 | 96,4 | 1 | 3,6 | 28 | 100 |
| Imola | 81 | 7,5 | 973 | 89,6 | 32 | 3,0 | 1.086 | 100 |
| S.Orsola-Malpighi-Bologna | 299 | 9,8 | 2.665 | 87,6 | 77 | 2,5 | 3.041 | 100 |

Valori regionali:

- ✱ tasso di pretermine (e.g <37 sett.): 7.4%
- ✱ tasso di post-termine (e.g ≥42 sett.): 3.1%

peso neonatale

| Stabilimento di evento | Peso neonatale | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------|-------|----------|-----|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | ≥2.500 g | | Totale | |
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % |
| Porretta Terme | | | | | | | 128 | 100,0 | 128 | 100 |
| Bentivoglio | 4 | 0,4 | 1 | 0,1 | 44 | 4,2 | 997 | 95,3 | 1.046 | 100 |
| Maggiore - Bo | 16 | 0,6 | 16 | 0,6 | 128 | 4,7 | 2.562 | 94,1 | 2.722 | 100 |
| Villa Erbosa | | | | | | | 28 | 100,0 | 28 | 100 |
| Imola | | | 1 | 0,1 | 67 | 6,1 | 1.030 | 93,8 | 1.098 | 100 |
| S.Orsola-Bologna | 21 | 0,7 | 37 | 1,1 | 242 | 7,5 | 2.927 | 90,7 | 3.227 | 100 |

Valori regionali:

- ✱ nati di peso molto basso (VLBW): 1.1%
- ✱ nati di basso peso (LBW): 6.5%

rianimazione neonatale

| Stabilimento di evento | Rianimazione | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----|-------------|-----|----------|-------|----------|-----|
| | Ventilazione | | Intubazione | | nessuna | | Totale | |
| | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % | soggetti | % |
| Porretta Terme | 6 | 4,7 | . | . | 122 | 95,3 | 128 | 100 |
| Bentivoglio | 5 | 0,5 | 2 | 0,2 | 1.039 | 99,3 | 1.046 | 100 |
| Maggiore - Bologna | 107 | 3,9 | 19 | 0,7 | 2.596 | 95,4 | 2.722 | 100 |
| Villa Erbosa | . | . | . | . | 28 | 100,0 | 28 | 100 |
| Imola | 24 | 2,2 | 6 | 0,6 | 1.068 | 97,3 | 1.098 | 100 |
| S.Orsola-Bologna | 23 | 0,7 | 25 | 0,8 | 3.179 | 98,5 | 3.227 | 100 |

Valori regionali:

- ✱ ventilazione con maschera: 1.5%
- ✱ intubazione: 1.1%
- ✱ nessuna rianimazione: 97.5%

modalità del parto

| Stabilimento di evento | vaginale | | parto cesareo | | | | | | vaginale operativo | | | | totale | |
|------------------------|----------|------|---------------|------|-----------------------|-----|----------------------|------|--------------------|---|---------|-----|--------|-----|
| | | | elettivo | | non travaglio urgente | | in travaglio urgente | | forcipe | | ventosa | | | |
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| Porretta Terme | 121 | 94,5 | 1 | 0,8 | . | . | 6 | 4,7 | . | . | . | . | 128 | 100 |
| Bentivoglio | 695 | 66,4 | 195 | 18,6 | 3 | 0,3 | 136 | 13,0 | . | . | 17 | 1,6 | 1.046 | 100 |
| Maggiore - Bo | 2.000 | 73,5 | 352 | 12,9 | 193 | 7,1 | 148 | 5,4 | . | . | 29 | 1,1 | 2.722 | 100 |
| Villa Erbosa | 21 | 75,0 | 3 | 10,7 | . | . | 4 | 14,3 | . | . | . | . | 28 | 100 |
| Imola | 736 | 67,0 | 215 | 19,6 | 5 | 0,5 | 136 | 12,4 | . | . | 6 | 0,6 | 1.098 | 100 |
| S.Orsola-Bo | 2.067 | 64,1 | 666 | 20,6 | . | . | 447 | 13,9 | . | . | 47 | 1,5 | 3.227 | 100 |


Valori regionali:

- ✱ vaginale: 68.0%
- ✱ parto cesareo elettivo: 17.2%
- ✱ parto cesareo fuori travaglio urgente: 3.1%
- ✱ parto cesareo in travaglio urgente: 10.2%
- ✱ parto operativo con ventosa: 1.3%


necessità
di ricodifica

Classificazione di Robson

| | |
|------|--|
| I | Nullipare, singolo, cefalico, ≥ 37 settimane, travaglio spontaneo |
| II | Nullipare, singolo, cefalico, ≥ 37 settimane, travaglio indotto o TC prima del travaglio |
| III | Multipare (escluso precedente TC), singolo, cefalico, ≥ 37 settimane, travaglio spontaneo |
| IV | Multipare (escluso TC), singolo, cefalico, ≥ 37 settimane, travaglio indotto o TC prima del travaglio |
| V | Precedente parto cesareo, singolo, cefalico, ≥ 37 settimane |
| VI | Nullipare, presentazione podalica |
| VII | Multipare, presentazione podalica (incluso precedente TC) |
| VIII | Gravidanze multiple (incluso precedente TC) |
| IX | Presentazioni anomale (incluso precedente TC) |
| X | Pretermine (≤ 36 settimane), presentazione cefalica (incluso prec. TC) |




Tasso di TC nelle singole classi di Robson



Dati Regione Emilia Romagna 2004

II classe di Robson: nullipare, singolo cefalico, ≥ 37 settimane, travaglio indotto o TC prima del travaglio

Gruppo B




Bentivoglio



Imola

II classe di Robson: nullipare, singolo cefalico, ≥ 37 settimane, travaglio indotto o TC prima del travaglio

Gruppo C




● Maggiore

○ S. Orsola

V classe di Robson:
precedente TC, singolo cefalico, ≥ 37 settimane

Gruppo B




Bentivoglio



Imola

V classe di Robson:
precedente TC, singolo cefalico, ≥ 37 settimane

Gruppo C




● Maggiore

○ S. Orsola

VI classe di Robson: nullipare, presentazione podalica

Gruppo B




Bentivoglio



Imola

VI classe di Robson: nullipare, presentazione podalica

Gruppo C



● Maggiore

● S. Orsola