

Documento PTR n. 291 relativo a:

**SCHEDA REGIONALE
PER LA PRESCRIZIONE DI
DALBAVANCINA**

*Aggiornamento Novembre 2016
Settembre 2016*

Scheda cartacea per la prescrizione di Dalbavancina

Indicazioni terapeutiche: dalbavancina è indicata per il trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti. Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici

La rimborsabilità (PT AIFA) è limitata alle sole infezioni complicate^o della cute e dei tessuti molli quando si sospetta o si ha la certezza che l'infezione sia causata da batteri Gram positivi sensibili.

La CRF ne raccomanda l'uso nelle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (in particolare nelle infezioni del sito chirurgico o nelle celluliti) con eziologia dimostrata/sospetta da MRSA/MRSE Rifampicino-R, in cui non vi siano alternative terapeutiche o in cui le condizioni cliniche ne consentano una gestione fuori dall'ospedale.

Azienda Sanitaria: _____	
Unità Operativa Richiedente: _____	Data: ____ / ____ / ____
Paziente (nome, cognome): _____	
Data di nascita: ____ / ____ / ____	Sesso: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: _____	
ASL di Residenza: _____	Provincia: _____ Regione: _____

Diagnosi:	
<input type="checkbox"/> infezione del sito chirurgico <input type="checkbox"/> cellulite <input type="checkbox"/> Altro, specificare _____	
<input type="checkbox"/> certa: specificare: _____	<input type="checkbox"/> sospetta

**Si fa presente che lo studio registrativo ha arruolato nel 53% dei casi pazienti affetti da cellulite, in circa il 26% da ascessi maggiori, nel restante 21% pazienti con infezione del sito chirurgico.*

Specificare se:

inizio terapia trattamento successivo. Specificare _____

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco	Descrizione	Dosaggio
Dalbavancina	500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione	<input type="checkbox"/> Giorno 1: 1000 mg <input type="checkbox"/> Giorno 8: 500 mg <input type="checkbox"/> Giorno 1 (unica infusione) : 1500 mg

Dose raccomandata e durata del trattamento per gli adulti: la dose raccomandata per la dalbavancina è 1.500 mg somministrati come singola infusione da 1.500 mg oppure 1.000 mg seguiti, una settimana dopo, da 500 mg. Esistono dati limitati sulla sicurezza e sull'efficacia della dalbavancina somministrata per più di due dosi (a distanza di una settimana).

Nome e cognome del Medico*: _____

Recapiti del Medico*: _____

** La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985).*

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE _____